湖南省农业农村厅
关于2021年主要农作物品种审定情况的
公　告

湘农告〔2021〕5号

湖南省农作物品种审定委员会审定通过了钰两优771、福玉18、衡春豆9号、湘X0935等99个稻、玉米、大豆、棉花品种，现予公告。

附件：1.2021年审定通过的主要农作物品种名称
2.2021年审定通过的主要农作物品种简介

湖南省农业农村厅
2021年3月29日

附件 1

2021 年审定通过的主要农作物品种名称

审定编号	品种名称	页码
湘审稻 20210001	钰两优 771	3
湘审稻 20210002	柒两优 43	4
湘审稻 20210003	陵两优 238	5
湘审稻 20210004	春两优 1705	6
湘审稻 20210005	深和两优 332	7
湘审稻 20210006	爽两优丰籼占	8
湘审稻 20210007	民两优丝苗	9
湘审稻 20210008	深 3 优 5354	10
湘审稻 20210009	润君优 656	11
湘审稻 20210010	朝优华占	12
湘审稻 20210011	天两优 528	13
湘审稻 20210012	华浙优 261	14
湘审稻 20210013	泓两优 570	15
湘审稻 20210014	旗两优隆王丝苗	16
湘审稻 20210015	泓两优 2137	17
湘审稻 20210016	英两优华占	18
湘审稻 20210017	晶两优农占	19
湘审稻 20210018	伍两优泰丝	20
湘审稻 20210019	伍两优 8549	21
湘审稻 20210020	玮两优 8675	22
湘审稻 20210021	珠两优 1597	23
湘审稻 20210022	宇两优 121	24
湘审稻 20210023	珠两优 5298	25
湘审稻 20210024	韵两优 2935	26
湘审稻 20210025	韵两优 6937	27
湘审稻 20210026	韵两优 6176	28

审定编号	品种名称	页码
湘审稻 20210027	旗两优 6176	29
湘审稻 20210028	韵两优 7484	30
湘审稻 20210029	轩两优 1597	31
湘审稻 20210030	民升优 6176	32
湘审稻 20210031	金科丝苗 5 号	33
湘审稻 20210032	桃优玉晶	34
湘审稻 20210033	桃优玉珍	35
湘审稻 20210034	晖两优 8612	36
湘审稻 20210035	星泰优 018	37
湘审稻 20210036	泰优农 39	38
湘审稻 20210037	旗两优隆王丝苗	39
湘审稻 20210038	青香优丝苗	40
湘审稻 20210039	振两优 1206	41
湘审稻 20210040	振两优 7905	42
湘审稻 20210041	扬泰优 128	43
湘审稻 20210042	原优 5009	44
湘审稻 20210043	昱香两优馥香占	45
湘审稻 20210044	丽香优纳丝	46
湘审稻 20210045	民香优 1174	47
湘审稻 20210046	莹优 1097	48
湘审稻 20210047	健湘丝苗	49
湘审稻 20210048	耕香优银粘	50
湘审稻 20210049	松雅 17	51
湘审稻 20210050	佳优长晶	52
湘审稻 20210051	惠湘优玉晶	53
湘审稻 20210052	垦优 18	54

审定编号	品种名称	页码
湘审稻 20210053	莉优丝苗	55
湘审稻 20210054	华盛优莉香	56
湘审稻 20210055	晶泰优莉香	57
湘审稻 20210056	万丰优丝占	58
湘审稻 20210057	耕香优荔丝苗	59
湘审稻 20210058	更香优巴丝	60
湘审稻 20210059	甬优 6708	61
湘审稻 20210060	美优晶丝苗	62
湘审稻 20210061	文早糯 1 号	63
湘审稻 20216001	玮两优 6246	64
湘审稻 20216002	臻两优 1468	65
湘审稻 20216003	隆两优 6018	66
湘审稻 20216004	臻两优农占	67
湘审稻 20216005	臻两优钰占	68
湘审稻 20216006	炫两优 2646	69
湘审稻 20216007	悦两优 2945	70
湘审稻 20216008	振两优钰占	71
湘审稻 20216009	悦两优 2056	72
湘审稻 20216010	炫两优 8749	73
湘审稻 20216011	振两优 6246	74
湘审稻 20216012	玮两优倩丝	75
湘审稻 20216013	炫两优 8736	76
湘审稻 20216014	臻两优泰丝	77
湘审稻 20216015	振两优 3228	78
湘审稻 20216016	晖两优 1308	79
湘审稻 20216017	晖两优钰占	80
湘审稻 20216018	韵两优 526	81
湘审稻 20216019	隆锋优 3228	82
湘审稻 20216020	隆晶优 1266	83

审定编号	品种名称	页码
湘审稻 20216021	增两优 5629	84
湘审稻 20216022	隆锋优 8262	85
湘审玉 20210001	福玉 18	86
湘审玉 20210002	K 玉 28	87
湘审玉 20210003	吉玉 518	88
湘审玉 20210004	云黑糯 50 号	89
湘审玉 20210005	精彩 919	90
湘审玉 20210006	晶甜 717	91
湘审玉 20210007	广良甜 27 号	92
湘审豆 20210001	衡春豆 9 号	93
湘审豆 20210002	中豆 45	94
湘审豆 20210003	湘春褐豆 32	95
湘审豆 20210004	湘鲜春豆 1 号	96
湘审棉 20210001	湘 X0935	97
湘审棉 20210002	中棉所 1606	98
湘审棉 20210003	中 MB901	99
湘审棉 20210004	湘棉 36	100
湘审棉 20210005	盐棉 462	101

附件 2

2021 年审定通过的主要农作物品种简介

审定编号： 湘审稻 20210001

品种名称： 钰两优 771

申 请 者： 湖南亚华种业科学研究院

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 湘钰 621S × 华 771

特征特性：籼型两系杂交早稻中熟品种。在湖南省作中熟早稻栽培，全生育期 113.8 天，比对照株两优 819 长 1.1 天。株高 83.7 厘米，亩有效穗 21.9 万穗，每穗总粒数 125.0 粒，结实率 82.2%，千粒重 26.0 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 4.3 级，穗瘟损失率 2.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.0，白叶枯病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 81.3%，精米率 70.0%，整精米率 59.2%，粒长 6.2 毫米，长宽比 2.7，垩白粒率 68%，垩白度 18.3%，透明度 2 级，碱消值 3.2 级，胶稠度 50 毫米，直链淀粉含量 20.4%。

产量表现：2018 年参加湖南省早稻中熟组区域试验，平均亩产 528.2 千克，比对照增产 5.9%；2019 年续试，平均亩产 502.6 千克，比对照增产 1.6%；两年区域试验平均亩产 515.4 千克，比对照增产 3.8%。2020 年生产试验，平均亩产 398.7 千克，比对照增产 4.3%。

栽培技术要点：3 月底播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、白叶枯病、纹枯病、南方黑条矮缩病、稻瘟病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20210002

品种名称：柒两优 43

申 请 者：湖南省水稻研究所

育 种 者：湖南省水稻研究所、株洲市农业科学研究所

品种来源：株 712S ×早 43

特征特性：籼型两系杂交早稻中熟品种。在湖南省作中熟早稻栽培，全生育期 113.3 天，比对照株两优 819 短 0.3 天。株高 82.6 厘米，株型适中，株高 82.6 厘米，亩有效穗 21.3 万穗，每穗总粒数 141.2 粒，结实率 80.2%，千粒重 26.6 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 78.2%，精米率 67.7%，整精米率 58.2%，粒长 5.7 毫米，长宽比 2.3，垩白粒率 66%，垩白度 17.5%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 50 毫米，直链淀粉含量 18.4%。

产量表现：2019 年参加湖南省早稻中熟组区域试验，平均亩产 518.2 千克，比对照增产 4.7%；2020 年续试，平均亩产 518.8 千克，比对照增产 5.3%；两年区域试验平均亩产 518.5 千克，比对照增产 5.0%。2020 年生产试验，平均亩产 502.4 千克，比对照增产 4.6%。

栽培技术要点：3 月底播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 3.0-3.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20210003

品种名称：陵两优 238

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：湘陵 628S × 华 1238

特征特性：籼型两系杂交早稻迟熟品种。在湖南省作迟熟早稻栽培，全生育期 115.6 天，比对照陆两优 996 长 0.5 天。株高 86.5 厘米，亩有效穗 20.9 万穗，每穗总粒数 129.4 粒，结实率 79.6%，千粒重 27.0 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 3.7 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 2.7，白叶枯病 7.0 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 69.7%，整精米率 59.5%，粒长 6.1 毫米，长宽比 2.5，垩白粒率 73%，垩白度 20.1%，透明度 2 级，碱消值 3.2 级，胶稠度 50 毫米，直链淀粉含量 20.1%。

产量表现：2018 年参加湖南省早稻迟熟组区域试验，平均亩产 526.9 千克，比对照增产 0.7%；2019 年续试，平均亩产 533.1 千克，比对照增产 2.0%；两年区域试验平均亩产 530.0 千克，比对照增产 1.4%。2020 年生产试验，平均亩产 420.2 千克，比对照增产 1.8%。

栽培技术要点：3 月底播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、白叶枯病、纹枯病、南方黑条矮缩病、稻瘟病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20210004

品种名称：春两优 1705

申 请 者：宜春学院

育 种 者：宜春学院

品种来源：春 80S×R1705

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 136.6 天，比对照 Y 两优 1 号短 0.7 天。株高 118.2 厘米，亩有效穗 14.8 万穗，每穗总粒数 196.6 粒，结实率 88.8%，千粒重 25.4 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.3 级，稻瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.7，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 79.9%，精米率 68.8%，整精米率 47.9%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 17%，垩白度 5.5%，透明度 1 级，碱消值 4.0 级，胶稠度 63 毫米，直链淀粉含量 15.7%。

产量表现：2019 年参加湖南省中稻迟熟组区域试验，平均亩产 666.8 千克，比对照增产 4.1%；2020 年续试，平均亩产 611.5 千克，比对照增产 3.7%；两年区域试验平均亩产 639.2 千克，比对照增产 3.9%。2020 年生产试验，平均亩产 581.0 千克，比对照增产 1.1%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.25 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20210005

品种名称：深和两优 332

申 请 者：湖南杂交水稻研究中心

育 种 者：湖南杂交水稻研究中心

品种来源：深和 S×R332

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 137.2 天，比对照 Y 两优 1 号长 0.5 天。株高 114.9 厘米，亩有效穗 14.4 万穗，每穗总粒数 198.6 粒，结实率 88.9%，千粒重 26.6 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 4.7 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.4，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 77.0%，精米率 69.1%，整精米率 64.9%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.0，垩白粒率 12%，垩白度 3.2%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 14.3%，稻米蒸煮食用感官评价 82.2 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省中稻迟熟组区域试验，平均亩产 702.4 千克，比对照增产 10.2%；2020 年续试，平均亩产 632.6 千克，比对照增产 7.3%；两年区域试验平均亩产 667.5 千克，比对照增产 8.8%。2020 年生产试验，平均亩产 620.9 千克，比对照增产 6.7%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 6.0 千克，大田亩用种量 0.8-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210006

品种名称： 爽两优丰籼占

申 请 者： 湖南杂交水稻研究中心

育 种 者： 湖南杂交水稻研究中心

品种来源： 爽 1S × 丰籼占

特征特性： 籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 140.7 天，比对照 Y 两优 1 号长 3.6 天。株高 125.0 厘米，亩有效穗 15.0 万穗，每穗总粒数 225.9 粒，结实率 84.6%，千粒重 24.9 克。抗性：叶瘟 4.5 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 4.1，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 7.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 70.5%，整精米率 67.3%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.0，垩白粒率 13%，垩白度 3.2%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 75 毫米，直链淀粉含量 14.7%，稻米蒸煮食用感官评价 83.4 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现： 2019 年参加湖南省中稻迟熟组区域试验，平均亩产 664.1 千克，比对照增产 4.2%；2020 年续试，平均亩产 615.5 千克，比对照增产 4.4%；两年区域试验平均亩产 639.8 千克，比对照增产 4.3%。2020 年生产试验，平均亩产 609.8 千克，比对照增产 4.3%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 6.0 千克，大田亩用种量 0.8-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210007

品种名称： 民两优丝苗

申 请 者： 怀化职业技术学院

育 种 者： 怀化职业技术学院、广东省农业科学院水稻研究所

品种来源： 民丰 520S × 五山丝苗

特征特性： 籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 137.9 天，比对照 Y 两优 1 号长 0.8 天。株高 115.4 厘米，亩有效穗 15.4 万穗，每穗总粒数 199.3 粒，结实率 89.5%，千粒重 24.6 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.1，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 72.2%，整精米率 66.5%，粒长 6.5 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 32%，垩白度 7.5%，透明度 2 级，碱消值 4.3 级，胶稠度 50 毫米，直链淀粉含量 19.5%。

产量表现： 2019 年参加湖南省中稻迟熟组区域试验，平均亩产 676.0 千克，比对照增产 9.1%；2020 年续试，平均亩产 644.6 千克，比对照增产 8.0%；两年区域试验平均亩产 660.3 千克，比对照增产 8.6%。2020 年生产试验，平均亩产 634.2 千克，比对照增产 8.8%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 4 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20210008

品种名称：深 3 优 5354

申 请 者：湖南杂交水稻研究中心

育 种 者：湖南杂交水稻研究中心

品种来源：深 39A×R5354

特征特性：籼型三系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 123.6 天，比对照 C 两优 343 长 1.6 天。株高 116.8 厘米，亩有效穗 17.5 万穗，每穗总粒数 214.8 粒，结实率 78.4%，千粒重 24.8 克。抗性：叶瘟 3.9 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.9，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 80.4%，精米率 68.6%，整精米率 62.1%，粒长 6.5 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 20%，垩白度 5.2%，透明度 2 级，碱消值 5.3 级，胶稠度 32 毫米，直链淀粉含量 20.2%。

产量表现：2019 年参加湖南省中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 693.2 千克，比对照增产 8.5%；2020 年续试，平均亩产 642.1 千克，比对照增产 6.4%；两年区域试验平均亩产 667.7 千克，比对照增产 7.5%。2020 年生产试验，平均亩产 584.8 千克，比对照增产 1.1%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 6.0 千克，大田亩用种量 0.8-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210009

品种名称： 润君优 656

申 请 者： 湖南鑫盛华丰种业科技有限公司、岳阳市金穗作物研究所

育 种 者： 湖南鑫盛华丰种业科技有限公司、岳阳市金穗作物研究所

品种来源： 润君 A×P656

特征特性： 该品种属籼型三系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，生育期 120.5 天，比对照 C 两优 343 短 1.2 天。株高 119.2 厘米，亩有效穗 19.9 万穗，每穗总粒数 211.2 粒，结实率 81.2%，千粒重 23.0 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.7，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 80.3%，精米率 71.6%，整精米率 66.7%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 32%，垩白度 8.3%，透明度 2 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 78 毫米，直链淀粉含量 13.3%。

产量表现： 2018 年参加湖南省中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 712.3 千克，比对照增产 7.7%；2019 年续试，平均亩产 694.4 千克，比对照增产 6.1%；两年区域试验平均亩产 703.4 千克，比对照增产 6.9%。2020 年生产试验，平均亩产 660.9 千克，比对照增产 5.6%。

栽培技术要点： 5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.25 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米× 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻飞虱、螟虫、稻瘟病、白叶枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210010

品种名称： 朝优华占

申 请 者： 湖南省水稻研究所

育 种 者： 湖南省水稻研究所、中国水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所

品种来源： 朝 1A × 华占

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 122.5 天，比对照天优华占短 0.5 天。株高 118.2 厘米，亩有效穗 20.8 万穗，每穗总粒数 174.5 粒，结实率 77.6%，千粒重 25.2 克。抗性：叶瘟 4.2 级，穗瘟 5.4 级，稻瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.9，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 80.6%，精米率 72.1%，整精米率 67.2%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 8%，垩白度 1.8%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.1%，稻米蒸煮食用感官评价 81.2 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2019 年参加湖南省晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 718.9 千克，比对照增产 0.8%；2020 年续试，平均亩产 590.0 千克，比对照减产 0.3%；两年区域试验平均亩产 654.5 千克，比对照增产 0.3%。2020 年生产试验，平均亩产 553.9 千克，比对照增产 2.6%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，忌脱水过早，适时收获。注意防治纹枯病、稻瘟病、稻曲病、稻飞虱等病虫害。

审定意见： 该品种经省级统一试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210011

品种名称： 天两优 528

申 请 者： 湖南奥谱隆科技股份有限公司

育 种 者： 湖南奥谱隆科技股份有限公司

品种来源： 天安 S × 奥 R528

特征特性： 籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 131.1 天，比对照 Y 两优 1 号短 2.3 天。株高 118.0 厘米，亩有效穗 16.2 万穗，每穗总粒数 198.7 粒，结实率 83.9%，千粒重 26.4 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 6.0 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 70.4%，整精米率 65.4%，粒长 6.3 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 32%，垩白度 9.8%，透明度 2 级，碱消值 4.0 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 12.1%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 675.1 千克，比对照增产 3.4%；2020 年续试，平均亩产 595.2 千克，比对照增产 1.3%；两年区域试验平均亩产 635.2 千克，比对照增产 2.4%。2020 年生产试验，平均亩产 639.5 千克，比对照增产 5.5%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 7.0 千克，大田亩用种量 1.0-1.2 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20210012

品种名称：华浙优 261

申 请 者：湖南金健种业科技有限公司

育 种 者：中国水稻研究所、浙江勿忘农种业股份有限公司、湖南金健种业科技有限公司

品种来源：华浙 2A×16T-261

特征特性：籼型三系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 127.1 天，比对照 Y 两优 1 号短 5.9 天。株高 120.2 厘米，亩有效穗 16.4 万穗，每穗总粒数 190.2 粒，结实率 89.9%，千粒重 23.0 克。抗性：叶瘟 4.5 级，穗瘟 6.7 级，稻瘟损失率 4.3 级，稻瘟病综合抗性指数 5.0，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 79.8%，精米率 70.3%，整精米率 63.5%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 13%，垩白度 3.8%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 89 毫米，直链淀粉含量 13.8%。在 2020 年湖南省第十三次优质稻品种评选中，被评为二等优质稻品种。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 670.4 千克，比对照增产 5.1%；2020 年续试，平均亩产 606.4 千克，比对照增产 1.5%；两年区域试验平均亩产 638.4 千克，比对照增产 3.3%。2020 年生产试验，平均亩产 591.4 千克，比对照增产 4.2%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8-10 万。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210013

品种名称： 泓两优 570

申 请 者： 湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 泓 92S×K570

特征特性： 籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 128.2 天，比对照 Y 两优 1 号短 4.5 天。株高 118.0 厘米，亩有效穗 16.8 万穗，每穗总粒数 169.8 粒，结实率 86.8%，千粒重 23.7 克。抗性：叶瘟 4.0 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 68.6%，整精米率 59.5%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.9，垩白粒率 10%，垩白度 2.6%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 15.2%，稻米蒸煮食用感官评价 85.7 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 563.9 千克，比对照减产 11.8%；2020 年续试，平均亩产 566.1 千克，比对照减产 6.7%；两年区域试验平均亩产 565.0 千克，比对照减产 9.3%。2020 年生产试验，平均亩产 578.2 千克，比对照增产 1.7%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210014

品种名称： 旗两优隆王丝苗

申 请 者： 湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司、湖南优至种业有限公司

品种来源： 旗 482S × 隆王丝苗

特征特性： 籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 128.1 天，比对照 Y 两优 1 号短 4.7 天。株高 110.2 厘米，亩有效穗 15.6 万穗，每穗总粒数 170.5 粒，结实率 86.6%，千粒重 25.4 克。抗性：叶瘟 3.7 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 3.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.9，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 79.8%，精米率 71.1%，整精米率 52.0%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.7，垩白粒率 18%，垩白度 5.0%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 89 毫米，直链淀粉含量 14.8%，稻米蒸煮食用感官评价 84.8 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 591.4 千克，比对照减产 7.5%；2020 年续试，平均亩产 561.9 千克，比对照减产 6.0%；两年区域试验平均亩产 576.7 千克，比对照减产 6.8%。2020 年生产试验，平均亩产 580.0 千克，比对照增产 2.1%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0–10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2–3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210015

品种名称： 泓两优 2137

申 请 者： 湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 泓 92S×R2137

特征特性： 籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 127.1 天，比对照 Y 两优 1 号短 5.9 天。株高 111.0 厘米，亩有效穗 16.5 万穗，每穗总粒数 165.7 粒，结实率 87.3%，千粒重 24.0 克。抗性：叶瘟 3.8 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 80.1%，精米率 71.5%，整精米率 65.9%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 9%，垩白度 2.2%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 72 毫米，直链淀粉含量 14.0%，稻米蒸煮食用感官评价 82.5 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2019 年参加湘种联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 598.9 千克，比对照减产 6.1%；2020 年续试，平均亩产 560.0 千克，比对照减产 4.7%；两年区域试验平均亩产 579.5 千克，比对照减产 5.4%。2020 年生产试验，平均亩产 587.7 千克，比对照增产 3.6%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0–10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2–3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210016

品种名称： 英两优华占

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、中国水稻研究所、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平种业有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 英 S×华占

特征特性： 籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 135.5 天，比对照 Y 两优 1 号长 1.7 天。株高 122.1 厘米，亩有效穗 18.2 万穗，每穗总粒数 207.6 粒，结实率 84.8%，千粒重 22.3 克。抗性：叶瘟 3.4 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 2.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.4，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 6.5 级。米质主要指标：糙米率 80.4%，精米率 71.5%，整精米率 67.7%，粒长 6.0 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 14%，垩白度 4.5%，透明度 2 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 12.5%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 699.3 千克，比对照增产 5.9%；2019 年续试，平均亩产 664.2 千克，比对照增产 5.0%；两年区域试验平均亩产 681.8 千克，比对照增产 5.5%。2019 年生产试验，平均亩产 647.9 千克，比对照增产 6.9%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20210017

品种名称：晶两优农占

申 请 者：湖南亚华种业科学研究院

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南亚华种业有限公司

品种来源：晶 4155S × 农占

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 122.1 天，比对照 C 两优 343 长 1.4 天。株高 114.6 厘米，亩有效穗 17.3 万穗，每穗总粒数 195.2 粒，结实率 83.0%，千粒重 24.0 克。抗性：叶瘟 2.7 级，穗瘟 4.3 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.1，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 80.9%，精米率 72.2%，整精米率 65.7%，粒长 6.5 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 13%，垩白度 3.0%，透明度 2 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.1%。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 658.2 千克，比对照增产 3.9%；2020 年续试，平均亩产 599.9 千克，比对照增产 4.0%；两年区域试验平均亩产 629.1 千克，比对照增产 4.0%。2020 年生产试验，平均亩产 555.6 千克，比对照增产 2.2%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，严控中后期偏施氮肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、稻瘟病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210018

品种名称：伍两优泰丝

申 请 者：湖南亚华种业科学研究院

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：晶 4155S × 泰丝

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 125.2 天，比对照 C 两优 343 长 4.1 天。株高 121.3 厘米，亩有效穗 17.7 万穗，每穗总粒数 183.9 粒，结实率 79.4%，千粒重 23.3 克。抗性：叶瘟 2.8 级，穗瘟 4.7 级，穗瘟损失率 2.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.0，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 79.1%，精米率 69.6%，整精米率 62.0%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 11%，垩白度 2.6%，透明度 1 级，碱消值 6.3 级，胶稠度 67 毫米，直链淀粉含量 15.5%，稻米蒸煮食用感官评价 81.2 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 604.8 千克，比对照减产 3.1%；2020 年续试，平均亩产 561.3 千克，比对照减产 3.1%；两年区域试验平均亩产 583.1 千克，比对照减产 3.1%。2020 年生产试验，平均亩产 569.3 千克，比对照增产 4.6%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、稻瘟病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210019

品种名称：伍两优 8549

申 请 者：湖南亚华种业科学研究院

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：晶 4155S × 华恢 8549

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 123.1 天，比对照 C 两优 343 长 2.5 天。株高 119.0 厘米，亩有效穗 18.6 万穗，每穗总粒数 194.8 粒，结实率 80.8%，千粒重 22.5 克。抗性：叶瘟 2.7 级，穗瘟 4.0 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 2.7，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 70.7%，整精米率 64.6%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 6%，垩白度 1.9%，透明度 2 级，碱消值 6.2 级，胶稠度 67 毫米，直链淀粉含量 15.4%，稻米蒸煮食用感官评价 78.0 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 612.7 千克，比对照减产 1.2%；2020 年续试，平均亩产 583.1 千克，比对照减产 2.0%；两年区域试验平均亩产 597.9 千克，比对照减产 1.6%。2020 年生产试验，平均亩产 574.5 千克，比对照增产 6.0%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、稻瘟病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210020

品种名称：玮两优 8675

申 请 者：湖南亚华种业科学研究院

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华玮 338S × 华恢 8675

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 122.5 天，比对照 C 两优 343 长 1.7 天。株高 126.2 厘米，亩有效穗 18.4 万穗，每穗总粒数 181.7 粒，结实率 82.3%，千粒重 25.1 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.4，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 79.7%，精米率 70.1%，整精米率 56.4%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.7，垩白粒率 13%，垩白度 2.8%，透明度 2 级，碱消值 5.2 级，胶稠度 67 毫米，直链淀粉含量 15.6%，稻米蒸煮食用感官评价 77.2 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 651.1 千克，比对照增产 3.3%；2020 年续试，平均亩产 595.1 千克，比对照增产 1.0%；两年区域试验平均亩产 623.1 千克，比对照增产 2.2%。2020 年生产试验，平均亩产 564.7 千克，比对照增产 3.8%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210021

品种名称：珠两优 1597

申 请 者：湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：珠 S×R1597

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 122.6 天，比对照 C 两优 343 长 1.8 天。株高 122.0 厘米，亩有效穗 19.3 万穗，每穗总粒数 190.8 粒，结实率 77.2%，千粒重 23.7 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.9，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 79.4%，精米率 70.2%，整精米率 59.5%，粒长 7.3 毫米，长宽比 4.0，垩白粒率 15%，垩白度 3.2%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 72 毫米，直链淀粉含量 14.8%，稻米蒸煮食用感官评价 78.7 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 656.8 千克，比对照增产 3.7%；2020 年续试，平均亩产 593.2 千克，比对照减产 0.3%；两年区域试验平均亩产 625.0 千克，比对照增产 1.7%。2020 年生产试验，平均亩产 563.2 千克，比对照增产 3.6%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210022

品种名称：宇两优 121

申 请 者：湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者：湖南隆平种业有限公司

品种来源：宇 340S×GR121

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 117.8 天，比对照 C 两优 343 短 3.1 天。株高 110.4 厘米，亩有效穗 20.4 万穗，每穗总粒数 179.5 粒，结实率 85.5%，千粒重 21.6 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 5.4 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.7，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 79.9%，精米率 70.8%，整精米率 53.2%，粒长 6.2 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 22%，垩白度 5.2%，透明度 2 级，碱消值 3.5 级，胶稠度 50 毫米，直链淀粉含量 16.9%。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 671.8 千克，比对照增产 0.8%；2019 年续试，平均亩产 628.8 千克，比对照增产 2.8%；两年区域试验平均亩产 650.3 千克，比对照增产 1.8%。2020 年生产试验，平均亩产 582.5 千克，比对照增产 7.4%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210023

品种名称：珠两优 5298

申 请 者：湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：珠 S×R5298

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 123.6 天，比对照 C 两优 343 长 2.6 天。株高 120.2 厘米，亩有效穗 19.4 万穗，每穗总粒数 179.6 粒，结实率 77.0%，千粒重 23.6 克。抗性：叶瘟 3.3 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 79.2%，精米率 70.7%，整精米率 61.2%，粒长 7.2 毫米，长宽比 4.1，垩白粒率 9%，垩白度 2.4%，透明度 1 级，碱消值 6.1 级，胶稠度 84 毫米，直链淀粉含量 15.7%，稻米蒸煮食用感官评价 79.4 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 609.7 千克，比对照减产 3.7%；2020 年续试，平均亩产 554.5 千克，比对照减产 4.3%；两年区域试验平均亩产 582.1 千克，比对照减产 4.0%。2020 年生产试验，平均亩产 563.3 千克，比对照增产 3.6%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210024

品种名称：韵两优 2935

申 请 者：湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：韵 2013S×R2935

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 117.3 天，比对照 C 两优 343 短 3.2 天。株高 110.9 厘米，亩有效穗 18.3 万穗，每穗总粒数 176.0 粒，结实率 82.4%，千粒重 23.7 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.7，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 79.7%，精米率 70.5%，整精米率 60.3%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.8，垩白粒率 16%，垩白度 3.9%，透明度 2 级，碱消值 6.1 级，胶稠度 88 毫米，直链淀粉含量 13.3%，稻米蒸煮食用感官评价 76.8 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 598.0 千克，比对照减产 2.2%；2020 年续试，平均亩产 580.1 千克，比对照减产 2.5%；两年区域试验平均亩产 589.0 千克，比对照减产 2.4%。2020 年生产试验，平均亩产 557.3 千克，比对照增产 2.7%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0–10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2–3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210025

品种名称：韵两优 6937

申 请 者：湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：韵 2013S×R6937

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 117.3 天，比对照 C 两优 343 短 3.9 天。株高 110.7 厘米，亩有效穗 17.9 万穗，每穗总粒数 195.5 粒，结实率 84.0%，千粒重 23.4 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 6.0 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 80.4%，精米率 72.2%，整精米率 65.8%，粒长 6.3 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 19%，垩白度 5.5%，透明度 2 级，碱消值 5.6 级，胶稠度 82 毫米，直链淀粉含量 14.6%。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 640.4 千克，比对照增产 2.6%；2020 年续试，平均亩产 597.8 千克，比对照增产 2.7%；两年区域试验平均亩产 619.1 千克，比对照增产 2.7%。2020 年生产试验，平均亩产 567.5 千克，比对照增产 4.1%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210026

品种名称：韵两优 6176

申 请 者：湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：韵 2013S×R6176

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 118.0 天，比对照 C 两优 343 短 2.9 天。株高 112.4 厘米，亩有效穗 19.8 万穗，每穗总粒数 183.2 粒，结实率 84.6%，千粒重 22.7 克。抗性：叶瘟 3.3 级，穗瘟 6.0 级，穗瘟损失率 3.3 级，稻瘟病综合抗性指数 4.0，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 79.1%，精米率 71.3%，整精米率 56.2%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 14.5%，垩白度 3.5%，透明度 2 级，碱消值 6.1 级，胶稠度 81 毫米，直链淀粉含量 14.3%，稻米蒸煮食用感官评价 78.3 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 647.0 千克，比对照增产 2.7%；2020 年续试，平均亩产 591.1 千克，比对照增产 2.1%；两年区域试验平均亩产 619.1 千克，比对照增产 2.4%。2020 年生产试验，平均亩产 563.4 千克，比对照增产 3.5%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210027

品种名称：旗两优 6176

申 请 者：湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：旗 482S×R6176

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 117.4 天，比对照 C 两优 343 短 3.8 天。株高 111.0 厘米，亩有效穗 17.7 万穗，每穗总粒数 187.6 粒，结实率 82.7%，千粒重 23.6 克。抗性：叶瘟 3.8 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.9，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 78.9%，精米率 71.1%，整精米率 59.8%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 13.5%，垩白度 3.0%，透明度 2 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 86 毫米，直链淀粉含量 14.5%，稻米蒸煮食用感官评价 76.6 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 637.6 千克，比对照增产 0.7%；2020 年续试，平均亩产 580.6 千克，比对照减产 0.2%；两年区域试验平均亩产 609.1 千克，比对照增产 0.3%。2020 年生产试验，平均亩产 564.1 千克，比对照增产 3.7%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210028

品种名称：韵两优 7484

申 请 者：湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：韵 2013S×R7484

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 125.1 天，比对照 C 两优 343 长 4.6 天。株高 113.2 厘米，亩有效穗 19.3 万穗，每穗总粒数 186.5 粒，结实率 80.6%，千粒重 22.4 克。抗性：叶瘟 4.5 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 80.0%，精米率 71.8%，整精米率 60.2%，粒长 6.3 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 15%，垩白度 4.0%，透明度 2 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 88 毫米，直链淀粉含量 15.3%，稻米蒸煮食用感官评价 76.7 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 609.8 千克，比对照减产 0.3%；2020 年续试，平均亩产 588.8 千克，比对照增产 2.9%；两年区域试验平均亩产 599.3 千克，比对照增产 1.3%。2020 年生产试验，平均亩产 569.5 千克，比对照增产 5.0%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210029

品种名称：轩两优 1597

申 请 者：湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：轩 S×R1597

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 125.1 天，比对照 C 两优 343 长 4.3 天。株高 129.5 厘米，亩有效穗 17.1 万穗，每穗总粒数 217.7 粒，结实率 77.4%，千粒重 23.6 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.3，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 6.5 级。米质主要指标：糙米率 78.1%，精米率 70.2%，整精米率 55.8%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.7，垩白粒率 9.5%，垩白度 2.5%，透明度 1 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 92 毫米，直链淀粉含量 13.9%，稻米蒸煮食用感官评价 77.6 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 638.0 千克，比对照增产 1.2%；2020 年续试，平均亩产 589.2 千克，比对照增产 2.9%；两年区域试验平均亩产 613.6 千克，比对照增产 2.1%。2020 年生产试验，平均亩产 558.9 千克，比对照增产 2.5%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210030

品种名称：民升优 6176

申 请 者：湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：民升 A×R6176

特征特性：籼型三系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 124.9 天，比对照 C 两优 343 长 4.1 天。株高 123.7 厘米，亩有效穗 19.0 万穗，每穗总粒数 192.4 粒，结实率 78.7%，千粒重 23.6 克。抗性：叶瘟 3.3 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.7，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 80.9%，精米率 71.7%，整精米率 59.1%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 23%，垩白度 5.8%，透明度 2 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 47 毫米，直链淀粉含量 19.1%。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 654.1 千克，比对照增产 4.8%；2020 年续试，平均亩产 618.7 千克，比对照增产 7.2%；两年区域试验平均亩产 636.4 千克，比对照增产 6.0%。2020 年生产试验，平均亩产 568.1 千克，比对照增产 4.2%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210031

品种名称：金科丝苗 5 号

申 请 者：深圳隆平金谷种业有限公司

育 种 者：深圳隆平金谷种业有限公司、深圳市金谷美香实业有限公司

品种来源：黄软占/合丰占

特征特性：籼型常规晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 116.1 天，比对照岳优 9113 长 2.8 天。株高 107.4 厘米，亩有效穗 20.7 万穗，每穗总粒数 168.2 粒，结实率 79.4%，千粒重 21.7 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.7，白叶枯病 4.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 79.6%，精米率 72.3%，整精米率 65.7%，粒长 6.5 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 8.0%，垩白度 1.7%，透明度 1 级，碱消值 6.6 级，胶稠度 77 毫米，直链淀粉含量 19.5%，稻米蒸煮食用感官评价 80.2 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2018 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 549.0 千克，比对照减产 3.0%；2019 年续试，平均亩产 575.1 千克，比对照减产 0.6%；两年区域试验平均亩产 562.1 千克，比对照减产 1.8%。2019 年生产试验，平均亩产 513.7 千克，比对照减产 4.1%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 15.0 千克，大田亩用种量 3.5-4.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 4 粒谷秧，亩基本苗 13 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210032

品种名称： 桃优玉晶

申 请 者： 袁氏种业高科技有限公司

育 种 者： 袁氏种业高科技有限公司、桃源县农业科学研究所

品种来源： 桃农 1A × 玉晶

特征特性： 籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 117.1 天，比对照岳优 9113 长 1.1 天。株高 110.7 厘米，亩有效穗 21.6 万穗，每穗总粒数 132.3 粒，结实率 76.6%，千粒重 27.6 克。抗性：叶瘟 4.0 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.9，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 81.2%，精米率 71.9%，整精米率 57.6%，粒长 7.2 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 10.5%，垩白度 2.5%，透明度 1 级，碱消值 6.1 级，胶稠度 84 毫米，直链淀粉含量 15.9%，稻米蒸煮食用感官评价 81.0 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 589.7 千克，比对照增产 0.6%；2020 年续试，平均亩产 548.0 千克，比对照增产 1.7%；两年区域试验平均亩产 568.9 千克，比对照增产 1.2%。2020 年生产试验，平均亩产 478.5 千克，比对照增产 1.3%。

栽培技术要点： 6 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210033

品种名称： 桃优玉珍

申 请 者： 袁氏种业高科技有限公司

育 种 者： 袁氏种业高科技有限公司、桃源县农业科学研究所

品种来源： 桃农 1A × 玉珍

特征特性： 籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 115.7 天，比对照岳优 9113 短 0.3 天。株高 108.8 厘米，亩有效穗 22.0 万穗，每穗总粒数 137.8 粒，结实率 76.4%，千粒重 25.6 克。抗性：叶瘟 3.3 级，穗瘟 6.0 级，穗瘟损失率 3.3 级，稻瘟病综合抗性指数 4.0，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 81.7%，精米率 72.8%，整精米率 61.2%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.7，垩白粒率 7.5%，垩白度 1.9%，透明度 1 级，碱消值 6.2 级，胶稠度 78 毫米，直链淀粉含量 16.3%，稻米蒸煮食用感官评价 81.3 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 563.2 千克，比对照减产 2.7%；2020 年续试，平均亩产 550.4 千克，比对照增产 3.2%；两年区域试验平均亩产 556.8 千克，比对照增产 0.3%。2020 年生产试验，平均亩产 477.9 千克，比对照增产 1.1 %。

栽培技术要点： 6 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210034

品种名称： 晖两优 8612

申 请 者： 湖南亚华种业科学研究院

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源： 华晖 217S × 华恢 8612

特征特性： 籼型两系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 114.4 天，比对照岳优 9113 短 1.5 天。株高 107.8 厘米，亩有效穗 22.2 万穗，每穗总粒数 155.5 粒，结实率 78.0%，千粒重 24.2 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 4.3 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.2，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 81.7%，精米率 72.7%，整精米率 64.6%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 18%，垩白度 4.5%，透明度 2 级，碱消值 4.0 级，胶稠度 90 毫米，直链淀粉含量 14.7%。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 634.8 千克，比对照增产 9.7%；2020 年续试，平均亩产 563.4 千克，比对照增产 5.7%；两年区域试验平均亩产 599.1 千克，比对照增产 7.7%。2020 年生产试验，平均亩产 506.3 千克，比对照增产 4.2%。

栽培技术要点： 湘北 6 月 20 日前播种，湘中南 6 月 23-25 日播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210035

品种名称： 星泰优 018

申 请 者： 湖南洞庭高科种业股份有限公司

育 种 者： 湖南洞庭高科种业股份有限公司、岳阳市农业科学研究院、中国种子集团有限公司

品种来源： 星泰 A×R018

特征特性： 籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 113.6 天，比对照岳优 9113 短 3.4 天。株高 99.3 厘米，亩有效穗 25.0 万穗，每穗总粒数 137.0 粒，结实率 74.9%，千粒重 24.7 克。抗性：叶瘟 4.7 级，穗瘟 6.3 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.7，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 1.8 级。米质主要指标：糙米率 82.8%，精米率 74.4%，整精米率 62.4%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 15%，垩白度 3.8%，透明度 2 级，碱消值 4.7 级，胶稠度 83 毫米，直链淀粉含量 15.8%。

产量表现： 2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 602.6 千克，比对照增产 4.2%；2020 年续试，平均亩产 538.4 千克，比对照增产 0.5%；两年区域试验平均亩产 570.5 千克，比对照增产 2.4%。2020 年生产试验，平均亩产 505.7 千克，比对照增产 4.3%。

栽培技术要点： 湘北 6 月 22 日左右播种，湘中南 6 月 28 日前播种。秧田亩播种量 12.0 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 26 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水孕穗抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号: 湘审稻 20210036

品种名称: 泰优农 39

申 请 者: 湖南金色农丰种业有限公司

育 种 者: 湖南金色农丰种业有限公司、湖南省水稻研究所、广东省农业科学水稻研究所、江西现代种业股份有限公司

品种来源: 泰丰 A×农香 39

特征特性: 籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 117.6 天，比对照岳优 9113 长 0.6 天。株高 114.2 厘米，亩有效穗 23.3 万穗，每穗总粒数 149.7 粒，结实率 76.6%，千粒重 23.4 克。抗性：叶瘟 3.8 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 80.7%，精米率 71.2%，整精米率 55.4%，粒长 7.6 毫米，长宽比 4.4，垩白粒率 6.5%，垩白度 1.2%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 83 毫米，直链淀粉含量 17.0%。在 2019 年湖南省第十二次优质稻品种评选中，被评为一等优质稻品种。

产量表现: 2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 611.4 千克，比对照增产 5.6%；2020 年续试，平均亩产 555.6 千克，比对照增产 3.7%；两年区域试验平均亩产 583.5 千克，比对照增产 4.7%。2020 年生产试验，平均亩产 488.1 千克，比对照增产 4.4%。

栽培技术要点: 6 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0-12.5 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追速肥，巧施穗粒肥，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不要脱水过早。注意防治稻瘟病、纹枯病、稻飞虱、螟虫等病虫害。

审定意见: 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210037

品种名称： 旗两优隆王丝苗

申 请 者： 湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司、湖南优至种业有限公司

品种来源： 旗 482S × 隆王丝苗

特征特性： 籼型两系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 118.9 天，比对照岳优 9113 长 2.9 天。株高 106.4 厘米，亩有效穗 21.5 万穗，每穗总粒数 144.1 粒，结实率 75.8%，千粒重 24.2 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.7，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 80.3%，精米率 73.0%，整精米率 66.1%，粒长 7.1 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 6%，垩白度 1.1%，透明度 1 级，碱消值 6.8 级，胶稠度 78 毫米，直链淀粉含量 15.2%，稻米蒸煮食用感官评价 83.1 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 572.4 千克，比对照减产 1.0%；2020 年续试，平均亩产 527.3 千克，比对照减产 1.1%；两年区域试验平均亩产 549.9 千克，比对照减产 1.1%。2020 年生产试验，平均亩产 492.4 千克，比对照增产 1.5%。

栽培技术要点： 6 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0–10.0 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2–3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号: 湘审稻 20210038

品种名称: 青香优丝苗

申 请 者: 袁氏种业高科技有限公司

育 种 者: 袁氏种业高科技有限公司

品种来源: 青香 A×金青占

特征特性: 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培,全生育期 121.8 天,比对照天优华占长 0.6 天。株高 118.1 厘米,亩有效穗 20.8 万穗,每穗总粒数 166.2 粒,结实率 77.0 %,千粒重 25.0 克。抗性:叶瘟 4.5 级,穗瘟 5.7 级,穗瘟损失率 3.3 级,稻瘟病综合抗性指数 4.2,白叶枯病 4.0 级,稻曲病 4.0 级。米质主要指标:糙米率 79.8%,精米率 71.7%,整精米率 62.2%,粒长 7.2 毫米,长宽比 3.8,垩白粒率 11.5%,垩白度 1.9%,透明度 1 级,碱消值 6.3 级,胶稠度 71 毫米,直链淀粉含量 16.6%。在 2020 年湖南省第十三次优质稻品种评选中,被评为二等优质稻品种。

产量表现: 2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻迟熟组区域试验,平均亩产 647.4 千克,比对照增产 2.9%;2020 年续试,平均亩产 583.1 千克,比对照增产 0.8%;两年区域试验平均亩产 615.3 千克,比对照增产 1.9%。2020 年生产试验,平均亩产 532.5 千克,比对照增产 1.3 %。

栽培技术要点: 6 月中旬播种,秧田亩播种量 10.0 千克,大田亩用种量 1.5 千克,秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米,每穴插 2 粒谷秧,亩基本苗 8 万左右。基肥足,追肥速,中期补,氮、磷、钾结合施用,适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸,浅水分蘖,及时晒田,有水壮苞抽穗,后期干干湿湿,不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见: 该品种经湘种联合体试验,符合湖南省稻品种审定标准,通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20210039

品种名称：振两优 1206

申 请 者：湖南亚华种业科学研究院

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、广东省农业科学院水稻研究所、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：振湘 S×R1206

特征特性：籼型两系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 120.3 天，比对照天优华占短 1.1 天。株高 113.7 厘米，亩有效穗 21.1 万穗，每穗总粒数 152.3 粒，结实率 76.0%，千粒重 25.0 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 4.7 级，穗瘟损失率 2.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.1，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 80.1%，精米率 71.3%，整精米率 64.0%，粒长 7.5 毫米，长宽比 4.0，垩白粒率 4.5%，垩白度 0.8%，透明度 1 级，碱消值 6.2 级，胶稠度 83 毫米，直链淀粉含量 15.2%，稻米蒸煮食用感官评价 81.2 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 600.0 千克，比对照减产 3.7%；2020 年续试，平均亩产 587.6 千克，比对照增产 0.9%；两年区域试验平均亩产 593.8 千克，比对照减产 1.4%。2020 年生产试验，平均亩产 534.4 千克，比对照增产 1.5%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20210040

品种名称：振两优 7905

申 请 者：湖南优至种业有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：振湘 S×华恢 7905

特征特性：籼型两系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 122.3 天，比对照天优华占长 1.1 天。株高 110.0 厘米，亩有效穗 21.7 万穗，每穗总粒数 145.7 粒，结实率 77.1%，千粒重 24.0 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 3.7 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 2.7，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 7.0 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 70.6%，整精米率 59.6%，粒长 7.2 毫米，长宽比 4.0，垩白粒率 11%，垩白度 2.7%，透明度 1 级，碱消值 6.7 级，胶稠度 76 毫米，直链淀粉含量 15.0%，稻米蒸煮食用感官评价 83.9 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 589.2 千克，比对照减产 7.0%；2020 年续试，平均亩产 584.3 千克，比对照增产 0.3%；两年区域试验平均亩产 586.8 千克，比对照减产 3.4%。2020 年生产试验，平均亩产 532.7 千克，比对照增产 1.2%。

栽培技术要点：6 月中旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210041

品种名称： 扬泰优 128

申 请 者： 湖南优至种业有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南优至种业有限公司、广东省农业科学院水稻研究所

品种来源： 扬泰 A×HR128

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 116.9 天，比对照天优华占短 4.4 天。株高 107.6 厘米，亩有效穗 20.6 万穗，每穗总粒数 169.4 粒，结实率 79.0%，千粒重 25.2 克。抗性：叶瘟 3.3 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.3 级，稻瘟病综合抗性指数 3.9，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 81.2%，精米率 73.3%，整精米率 70.4%，粒长 7.3 毫米，长宽比 3.8，垩白粒率 11%，垩白度 1.9%，透明度 1 级，碱消值 6.4 级，胶稠度 88 毫米，直链淀粉含量 15.8%。在 2020 年湖南省第十三次优质稻品种评选中，被评为二等优质稻品种。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 619.8 千克，比对照减产 0.5%；2020 年续试，平均亩产 605.0 千克，比对照增产 3.1%；两年区域试验平均亩产 612.4 千克，比对照增产 1.3%。2020 年生产试验，平均亩产 557.2 千克，比对照增产 5.2％。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 8.0-12.5 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 25 天左右。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210042

品种名称： 原优 5009

申 请 者： 湖南优至种业有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南优至种业有限公司、广西壮邦种业有限公司

品种来源： 原香 39A × HR5009

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 115.8 天，比对照天优华占短 5.3 天。株高 111.1 厘米，亩有效穗 20.7 万穗，每穗总粒数 194.9 粒，结实率 78.7%，千粒重 20.9 克。抗性：叶瘟 3.3 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 3.5 级，稻瘟病综合抗性指数 2.7，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 7.0 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 72.5%，整精米率 69.0%，粒长 6.5 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 15%，垩白度 3.9%，透明度 1 级，碱消值 5.8 级，胶稠度 77 毫米，直链淀粉含量 16.5%。

产量表现： 2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 642.8 千克，比对照增产 2.1%；2020 年续试，平均亩产 600.5 千克，比对照增产 3.8%；两年区域试验平均亩产 621.7 千克，比对照增产 3.0%。2020 年生产试验，平均亩产 544.3 千克，比对照增产 3.4%。

栽培技术要点： 湘北 6 月 18 日前播种，湘中南 6 月 25 日前播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量，后期控氮防倒伏。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210043

品种名称： 昱香两优馥香占

申 请 者： 湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、广西恒茂农业科技有限公司、江西科源种业有限公司、湖南隆平好粮网络科技有限公司

品种来源： 昱香 S×馥香占

特征特性： 籼型两系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 121.3 天，与对照天优华占相当。株高 110.1 厘米，亩有效穗 22.1 万穗，每穗总粒数 155.2 粒，结实率 78.6%，千粒重 22.2 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 6.5 级。米质主要指标：糙米率 80.7%，精米率 72.7%，整精米率 66.4%，粒长 7.1 毫米，长宽比 4.0，垩白粒率 5%，垩白度 0.9%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 69 毫米，直链淀粉含量 16.9%，稻米蒸煮食用感官评价 80.2 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 579.4 千克，比对照减产 8.6%；2020 年续试，平均亩产 569.2 千克，比对照减产 3.0%；两年区域试验平均亩产 574.3 千克，比对照减产 5.8%。2020 年生产试验，平均亩产 538.1 千克，比对照增产 2.2%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻纵卷叶螟、稻飞虱、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、稻瘟病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210044

品种名称： 丽香优纳丝

申 请 者： 湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者： 湖南民升种业科学研究院有限公司、广西恒茂农业科技有限公司、广西百香高科种业有限公司

品种来源： 丽香 A×R 纳丝

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种，在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 118.4 天，比对照天优华占短 3.0 天。株高 122.0 厘米，亩有效穗 21.8 万穗，每穗总粒数 151.4 粒，结实率 81.8%，千粒重 22.1 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.5，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 7.0 级。米质主要指标：糙米率 80.2%，精米率 70.7%，整精米率 65.2%，粒长 7.1 毫米，长宽比 4.1，垩白粒率 2.5%，垩白度 0.4%，透明度 1 级，碱消值 6.3 级，胶稠度 86 毫米，直链淀粉含量 17.7%，稻米蒸煮食用感官评价 82.4 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 582.6 千克，比对照减产 6.5%；2020 年续试，平均亩产 538.5 千克，比对照减产 7.5%；两年区域试验平均亩产 560.6 千克，比对照减产 7.0%。2020 年生产试验，平均亩产 533.2 千克，比对照增产 1.2%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻纵卷叶螟、稻飞虱、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、稻瘟病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210045

品种名称： 民香优 1174

申 请 者： 湖南民升种业科学研究院有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 民香 A×R1174

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 116.7 天，比对照天优华占短 4.5 天。株高 107.7 厘米，亩有效穗 21.2 万穗，每穗总粒数 146.1 粒，结实率 79.4%，千粒重 26.5 克。抗性：叶瘟 3.7 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 81.6%，精米率 73.0%，整精米率 58.3%，粒长 7.3 毫米，长宽比 3.8，垩白粒率 12.0%，垩白度 2.6%，透明度 2 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 44 毫米，直链淀粉含量 19.0%。

产量表现： 2019 年参加湖南省湘种联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 628.7 千克，比对照减产 0.8%；2020 年续试，平均亩产 595.9 千克，比对照增产 1.6%；两年区域试验平均亩产 612.3 千克，比对照增产 0.4%。2020 年生产试验，平均亩产 560.2 千克，比对照增产 6.2%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经湘种联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210046

品种名称： 莹优 1097

申 请 者： 湖南金源种业有限公司

育 种 者： 湖南金源种业有限公司、湖南胜必达种业研究所

品种来源： 莹 2A×R1097

特征特性： 籼型三系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 131.1 天，比对照 Y 两优 1 号短 2.0 天。株高 115.7 厘米，亩有效穗 15.5 万穗，每穗总粒数 207.0 粒，结实率 86.3%，千粒重 25.0 克。抗性：叶瘟 6.9 级，穗瘟 7.0 级，穗瘟损失率 5.3 级，稻瘟病综合抗性指数 6.2，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 6.5 级。米质主要指标：糙米率 79.9%，精米率 68.4%，整精米率 56.6%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 50%，垩白度 15.3%，透明度 2 级，碱消值 6.3 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 14.2%。

产量表现： 2019 年参加湖南省潇湘联合体中稻迟熟组区域试验，平均亩产 628.8 千克，比对照增产 5.1%；2020 年续试，平均亩产 639.3 千克，比对照增产 7.4%；两年区域试验平均亩产 634.1 千克，比对照增产 6.3%。2020 年生产试验，平均亩产 587.7 千克，比对照增产 5.1%。

栽培技术要点： 4 月中下旬播种。秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.2-1.5 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。需肥水平中等，基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20210047

品种名称：健湘丝苗

申 请 者：湖南永益农业科技发展有限公司

育 种 者：湖南永益农业科技发展有限公司

品种来源：粤农丝苗/华占

特征特性：籼型常规一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 117.6 天，比对照 C 两优 343 短 3.3 天。株高 110.4 厘米，亩有效穗 18.5 万穗，每穗总粒数 188.6 粒，结实率 84.8%，千粒重 20.7 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 6.0 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 4.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 79.1%，精米率 68.6%，整精米率 63.2%，粒长 6.1 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 6.5%，垩白度 1.7%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 91 毫米，直链淀粉含量 14.0%，稻米蒸煮食用感官评价 76.8 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省潇湘联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 577.5 千克，比对照减产 2.1%；2020 年续试，平均亩产 575.9 千克，比对照增产 3.6%；两年区域试验平均亩产 576.7 千克，比对照增产 0.8%。2020 年生产试验，平均亩产 558.9 千克，比对照增产 1.9%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 2.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早，适时收获。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210048

品种名称：耕香优银粘

申 请 者：湖南大地种业有限责任公司

育 种 者：湖南大地种业有限责任公司、广东现代种业发展有限公司、湖南省裕优丰种业科技所

品种来源：耕香 A×R 恒恢米岗银粘

特征特性：籼型三系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 115.0 天，比对照 C 两优 343 短 5.9 天。株高 112.7 厘米，亩有效穗 17.3 万穗，每穗总粒数 220.8 粒，结实率 80.9%，千粒重 21.7 克。抗性：叶瘟 3.7 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 4.4 级，稻瘟病综合抗性指数 4.8，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 81.6%，精米率 71.7%，整精米率 65.4%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 21%，垩白度 3.8%，透明度 2 级，碱消值 6.3 级，胶稠度 69 毫米，直链淀粉含量 13.5%。

产量表现：2019 年参加湖南省潇湘联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 598.2 千克，比对照增产 1.4%；2020 年续试，平均亩产 568.8 千克，比对照增产 1.8%；两年区域试验平均亩产 583.5 千克，比对照增产 1.6%。2020 年生产试验，平均亩产 562.4 千克，比对照增产 2.5%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20210049

品种名称：松雅 17

申 请 者：湖南正隆农业科技有限公司、湖南省水稻研究所

育 种 者：湖南正隆农业科技有限公司、湖南省水稻研究所

品种来源：金穗 128/R86//湘晚籼 13 号/华航 31

特征特性：籼型常规一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 116.8 天，比对照 C 两优 343 短 4.0 天。株高 114.7 厘米，亩有效穗 17.8 万穗，每穗总粒数 175.6 粒，结实率 83.3%，千粒重 22.4 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.4，白叶枯病 4.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 79.4%，精米率 71.7%，整精米率 64.3%，粒长 6.2 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 5.5%，垩白度 1.2%，透明度 2 级，碱消值 6.7 级，胶稠度 86 毫米，直链淀粉含量 13.7%，稻米蒸煮食用感官评价 75.8 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省潇湘联合体中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 557.8 千克，比对照减产 5.5%；2020 年续试，平均亩产 538.5 千克，比对照减产 3.2%；两年区域试验平均亩产 548.2 千克，比对照减产 4.4%。2020 年生产试验，平均亩产 554.8 千克，比对照增产 1.1%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 2.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。需肥水平中等，基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病等病虫害。

审定意见：该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210050

品种名称： 佳优长晶

申 请 者： 湖南佳和种业股份有限公司

育 种 者： 湖南佳和种业股份有限公司、安徽康乃尔农业科技有限公司

品种来源： 华占/玉针香

特征特性： 籼型常规晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 110.9 天，比对照岳优 9113 短 6.0 天。株高 101.7 厘米，亩有效穗 21.6 万穗，每穗总粒数 132.7 粒，结实率 77.8%，千粒重 25.8 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 3.7 级，稻瘟病综合抗性指数 4.4，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 79.9%，精米率 72.2%，整精米率 65.2%，粒长 7.9 毫米，长宽比 4.2，垩白粒率 13.5%，垩白度 2.0%，透明度 2 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 92 毫米，直链淀粉含量 16.4%，稻米蒸煮食用感官评价 82.7 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省潇湘联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 559.0 千克，比对照减产 2.1%；2020 年续试，平均亩产 558.8 千克，比对照增产 3.0%；两年区域试验平均亩产 558.9 千克，比对照增产 0.5%。2020 年生产试验，平均亩产 502.6 千克，比对照增产 1.4%。

栽培技术要点： 6 月中下旬播种，秧田亩播种量 15.0 千克，大田亩用种量 3.5-4.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 4 粒谷秧，亩基本苗 13 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210051

品种名称： 惠湘优玉晶

申 请 者： 湖南垦惠商业化育种有限责任公司

育 种 者： 湖南垦惠商业化育种有限责任公司、湖南佳和垦惠种业有限公司

品种来源： 惠湘 A × H1721

特征特性： 籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 110.4 天，比对照岳优 9113 短 2.9 天。株高 99.5 厘米，亩有效穗 21.4 万穗，每穗总粒数 136.5 粒，结实率 81.5%，千粒重 25.7 克。抗性：叶瘟 4.0 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 4.0 级，稻瘟病综合抗性指数 4.7，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 82.2%，精米率 73.7%，整精米率 67.4%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 9%，垩白度 1.8%，透明度 1 级，碱消值 6.2 级，胶稠度 85 毫米，直链淀粉含量 15.5%。

产量表现： 2018 年参加湖南省潇湘联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 602.9 千克，比对照增产 5.2%；2019 年续试，平均亩产 576.5 千克，比对照增产 2.0%；两年区域试验平均亩产 589.7 千克，比对照增产 3.6%。2019 年生产试验，平均亩产 532.1 千克，比对照增产 2.0%。

栽培技术要点： 6 月中下旬播种，秧田亩播种量 15.0 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210052

品种名称： 垦优 18

申 请 者： 湖南垦惠商业化育种有限责任公司

育 种 者： 湖南垦惠商业化育种有限责任公司、湖南佳和垦惠种业有限公司

品种来源： 垦丰 A × 惠恢 18

特征特性： 籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 119.6 天，比对照岳优 9113 长 2.9 天。株高 118.2 厘米，亩有效穗 20.0 万穗，每穗总粒数 138.2 粒，结实率 79.0%，千粒重 28.9 克。抗性：叶瘟 3.4 级，穗瘟 4.7 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.4，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 81.8%，精米率 71.8%，整精米率 55.1%，粒长 7.8 毫米，长宽比 4.0，垩白粒率 13%，垩白度 2.3%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 81 毫米，直链淀粉含量 19.0%。在 2019 年湖南省第十二次优质稻品种评选中，被评为二等优质稻品种。

产量表现：2019 年参加湖南省潇湘联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 587.4 千克，比对照增产 2.9%；2020 年续试，平均亩产 565.3 千克，比对照增产 4.4%；两年区域试验平均亩产 576.4 千克，比对照增产 3.7%。2020 年生产试验，平均亩产 509.0 千克，比对照增产 2.7%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 15.0 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 9 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210053

品种名称： 莉优丝苗

申 请 者： 湖南金源种业有限公司

育 种 者： 湖南金源种业有限公司

品种来源： 莉 1A × 源丝苗 1

特征特性： 籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 113.9 天，比对照岳优 9113 长 0.7 天。株高 112.4 厘米，亩有效穗 20.6 万穗，每穗总粒数 162.4 粒，结实率 80.0%，千粒重 23.3 克。抗性：叶瘟 3.4 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.3，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 6.0 级。米质主要指标：糙米率 81.9%，精米率 73.6%，整精米率 68.8%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 9%，垩白度 1.9%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 68 毫米，直链淀粉含量 18.9%，稻米蒸煮食用感官评价 80.2 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加湖南省潇湘联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 574.5 千克，比对照增产 0.2%；2019 年续试，平均亩产 578.9 千克，比对照增产 2.4%；两年区域试验平均亩产 576.7 千克，比对照增产 1.3%。2019 年生产试验，平均亩产 533.1 千克，比对照增产 2.2%。

栽培技术要点： 6 月中下旬播种。秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.5 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号: 湘审稻 20210054

品种名称: 华盛优莉香

申 请 者: 湖南金色农华种业科技有限公司

育 种 者: 湖南金色农华种业科技有限公司

品种来源: 华盛 A×莉香

特征特性: 籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 118.4 天，比对照岳优 9113 长 1.6 天。株高 107.5 厘米，亩有效穗 20.4 万穗，每穗总粒数 154.0 粒，结实率 78.8%，千粒重 24.7 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.8，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 81.8%，精米率 71.7%，整精米率 61.5%，粒长 7.5 毫米，长宽比 4.2，垩白粒率 7.5%，垩白度 2.0%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 76 毫米，直链淀粉含量 18.2%，稻米蒸煮食用感官评价 81.0 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现: 2019 年参加湖南省潇湘联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 568.6 千克，比对照减产 0.4%；2020 年续试，平均亩产 568.4 千克，比对照增产 4.8%；两年区域试验平均亩产 568.5 千克，比对照增产 2.2%。2020 年生产试验，平均亩产 502.1 千克，比对照增产 1.4%。

栽培技术要点: 6 月中旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，秧龄 26 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 9 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见: 该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210055

品种名称： 晶泰优莉香

申 请 者： 湖南金色农华种业科技有限公司

育 种 者： 湖南金色农华种业科技有限公司

品种来源： 晶泰 A×莉香

特征特性： 籼型三系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 118.8 天，比对照岳优 9113 长 2.5 天。株高 113.1 厘米，亩有效穗 21.9 万穗，每穗总粒数 159.4 粒，结实率 77.7%，千粒重 22.0 克。抗性：叶瘟 3.8 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 4.0 级，稻瘟病综合抗性指数 4.8，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 72.3%，整精米率 67.3%，粒长 7.1 毫米，长宽比 4.1，垩白粒率 6%，垩白度 1.5%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 79 毫米，直链淀粉含量 15.2%，稻米蒸煮食用感官评价 82.6 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加湖南省潇湘联合体晚稻中熟组区域试验，平均亩产 572.0 千克，比对照增产 1.2%；2020 年续试，平均亩产 556.6 千克，比对照增产 2.8%；两年区域试验平均亩产 564.3 千克，比对照增产 2.0%。2020 年生产试验，平均亩产 505.8 千克，比对照增产 2.2%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，秧龄 26 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 9 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210056

品种名称： 万丰优丝占

申 请 者： 湖南袁创超级稻技术有限公司

育 种 者： 湖南袁创超级稻技术有限公司

品种来源： 万丰 99A×创恢丝占

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 118.2 天，比对照天优华占短 2.1 天。株高 109.0 厘米，亩有效穗 18.6 万穗，每穗总粒数 197.0 粒，结实率 77.4%，千粒重 22.8 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 4.3 级，稻瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.3，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 80.3%，精米率 73.9%，整精米率 68.6%，粒长 6.4 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 4.5%，垩白度 0.5%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 82 毫米，直链淀粉含量 18.0%，稻米蒸煮食用感官评价 80.5 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2019 年参加湖南省潇湘联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 640.2 千克，比对照增产 5.2%；2020 年续试，平均亩产 612.3 千克，比对照增产 5.6%；两年区域试验平均亩产 626.3 千克，比对照增产 5.4%。2020 年生产试验，平均亩产 554.6 千克，比对照增产 3.5%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 8.0 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻飞虱、螟虫、稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210057

品种名称： 耕香优荔丝苗

申 请 者： 湖南大地种业有限责任公司

育 种 者： 湖南大地种业有限责任公司、湖南省裕优丰种业科技所、广东现代种业发展有限公司

品种来源： 耕香 A×恒恢荔香丝苗

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 118.3 天，比对照天优华占短 2.0 天。株高 118.9 厘米，亩有效穗 20.5 万穗，每穗总粒数 184.9 粒，结实率 77.8%，千粒重 21.6 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.7 级，稻瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.7，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 6.5 级。米质主要指标：糙米率 79.5%，精米率 71.6%，整精米率 59.3%，粒长 7.2 毫米，长宽比 4.0，垩白粒率 13.5%，垩白度 2.7%，透明度 1 级，碱消值 6.2 级，胶稠度 75 毫米，直链淀粉含量 15.8%，稻米蒸煮食用感官评价 82.9 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2019 年参加湖南省潇湘联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 588.2 千克，比对照减产 5.4%；2020 年续试，平均亩产 604.3 千克，比对照增产 3.4%；两年区域试验平均亩产 596.3 千克，比对照减产 1.0%。2020 年生产试验，平均亩产 548.8 千克，比对照增产 2.4%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210058

品种名称： 更香优巴丝

申 请 者： 长沙利诚种业有限公司

育 种 者： 长沙利诚种业有限公司、广西绿海种业有限公司

品种来源： 更香 A×R 巴丝

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 119.0 天，比对照天优华占短 1.3 天。株高 121.3 厘米，亩有效穗 21.1 万穗，每穗总粒数 167.8 粒，结实率 80.8%，千粒重 22.0 克。抗性：叶瘟 5.2 级，穗瘟 7.0 级，穗瘟损失率 4.4 级，稻瘟病综合抗性指数 5.3，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 79.9%，精米率 71.5%，整精米率 65.2%，粒长 7.4 毫米，长宽比 4.1，垩白粒率 5%，垩白度 1.4%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 80 毫米，直链淀粉含量 16.2%，稻米蒸煮食用感官评价 82.1 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2019 年参加湖南省潇湘联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 576.2 千克，比对照减产 7.3%；2020 年续试，平均亩产 585.4 千克，比对照增产 0.2%；两年区域试验平均亩产 580.8 千克，比对照减产 3.6%。2020 年生产试验，平均亩产 545.1 千克，比对照增产 1.8%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 8 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、南方黑条矮缩病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210059

品种名称： 甬优 6708

申 请 者： 湖南正隆农业科技有限公司、宁波种业股份有限公司

育 种 者： 湖南正隆农业科技有限公司、宁波种业股份有限公司

品种来源： 甬粳 67A × F7708

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 116.7 天，比对照天优华占短 3.6 天。株高 120.4 厘米，亩有效穗 16.6 万穗，每穗总粒数 193.5 粒，结实率 82.4%，千粒重 24.9 克。抗性：叶瘟 6.0 级，穗瘟 7.0 级，穗瘟损失率 4.0 级，稻瘟病综合抗性指数 5.3，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 83.4%，精米率 75.0%，整精米率 56.9%，粒长 6.2 毫米，长宽比 2.7，垩白粒率 10.5%，垩白度 2.3%，透明度 2 级，碱消值 6.6 级，胶稠度 83 毫米，直链淀粉含量 17.2%。

产量表现： 2019 年参加湖南省潇湘联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 637.4 千克，比对照增产 2.5%；2020 年续试，平均亩产 621.5 千克，比对照增产 6.4%；两年区域试验平均亩产 629.5 千克，比对照增产 4.5%。2020 年生产试验，平均亩产 569.8 千克，比对照增产 6.5%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 2.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8-10 万。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见： 该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210060

品种名称： 美优晶丝苗

申 请 者： 湖南金源种业有限公司

育 种 者： 湖南金源种业有限公司

品种来源： 美 1A × 晶丝苗 1

特征特性： 籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 121.1 天，比对照天优华占长 0.8 天。株高 113.5 厘米，亩有效穗 20.4 万穗，每穗总粒数 175.7 粒，结实率 75.8%，千粒重 22.5 克。抗性：叶瘟 4.3 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 3.4 级，稻瘟病综合抗性指数 4.2，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 7.0 级。米质主要指标：糙米率 83.4%，精米率 75.1%，整精米率 60.4%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.7，垩白粒率 14.5%，垩白度 2.8%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 65 毫米，直链淀粉含量 16.2%，稻米蒸煮食用感官评价 82.2 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2019 年参加湖南省潇湘联合体晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 608.0 千克，比对照减产 2.2%；2020 年续试，平均亩产 571.7 千克，比对照减产 2.1%；两年区域试验平均亩产 589.9 千克，比对照减产 2.2%。2020 年生产试验，平均亩产 545.8 千克，比对照增产 1.9%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种。秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.5-2.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 8 万左右。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经潇湘联合体试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20210061

品种名称： 文早糯 1 号

申 请 者： 湖南鑫盛华丰种业科技有限公司

育 种 者： 郴州市农业科学研究所、湖南省水稻研究所

品种来源： 越糯 3 号 × 郴早糯 1 号

特征特性： 籼型常规早稻中熟糯稻品种。在湖南省作中熟早稻栽培，全生育期111.3天，比对照株两优819长2.0天。株高102.3厘米，亩有效穗22.1万穗，每穗总粒数116.5粒，结实率84.0%，千粒重25.4克。抗性：叶瘟4.7级，穗瘟6.0级，穗瘟损失率3.7级，稻瘟病综合抗性指数4.5，白叶枯病5.0级。米质主要指标：糙米率80.7%，精米率71.5%，整精米率67.4%，粒长6.2毫米，长宽比2.8，阴糯米率11.0%，碱消值3.3级，胶稠度100毫米，直链淀粉含量1.5%。

产量表现： 2018年参加湖南省潇湘联合体早稻中熟组区域试验，平均亩产518.1千克，比对照减产0.4%；2019年续试，平均亩产461.2千克，比对照增产1.1%；两年区域试验平均亩产489.7千克，比对照增产0.4%。2019年生产试验，平均亩产475.2千克，比对照增产1.8%。

栽培技术要点： 3 月下旬播种，秧田亩播种量 25.0 千克，大田亩用种量 4.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2-4 粒谷秧，亩基本苗 10-12 万。基肥足，追肥速，中期补，氮、磷、钾结合施用，适当增加磷、钾肥用量。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病等病虫害。

审定意见： 该品种作为特种稻审定，订单生产。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟早稻种植。

审定编号：湘审稻 20216001

品种名称：玮两优 6246

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华玮 338S × 华恢 6246

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 139.8 天，比对照 Y 两优 1 号长 2.9 天。株高 122.3 厘米，亩有效穗 15.0 万穗，每穗总粒数 186.3 粒，结实率 86.0%，千粒重 26.2 克。抗性：叶瘟 2.5 级，穗瘟 2.7 级，穗瘟损失率 1.3 级，稻瘟病综合抗性指数 1.9，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 79.5%，精米率 70.5%，整精米率 61.4%，粒长 7.4 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 13%，垩白度 3.0%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 70 毫米，直链淀粉含量 15.9%。在 2020 年湖南省第十三次优质稻品种评选中，被评为二等优质稻品种。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟组区域试验，平均亩产 616.4 千克，比对照增产 0.9%；2020 年续试，平均亩产 615.2 千克，比对照增产 1.7%；两年区域试验平均亩产 615.8 千克，比对照增产 1.3%。2020 年生产试验，平均亩产 578.8 千克，比对照减产 1.4%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20216002

品种名称：臻两优 1468

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南百分农业科技有限公司

品种来源：隆臻 36S×R1468

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 139.2 天，比对照 Y 两优 1 号长 2.4 天。株高 120.0 厘米，亩有效穗 15.8 万穗，每穗总粒数 187.6 粒，结实率 87.0%，千粒重 25.8 克。抗性：叶瘟 2.7 级，穗瘟 3.7 级，穗瘟损失率 2.4 级，稻瘟病综合抗性指数 2.8，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 81.4%，精米率 72.8%，整精米率 57.7%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.0，垩白粒率 10%，垩白度 1.5%，透明度 1 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 70 毫米，直链淀粉含量 16.3%，稻米蒸煮食用感官评价 84.1 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟组区域试验，平均亩产 634.0 千克，比对照增产 3.7%；2020 年续试，平均亩产 624.0 千克，比对照增产 3.1%；两年区域试验平均亩产 629.0 千克，比对照增产 3.4%。2020 年生产试验，平均亩产 615.0 千克，比对照增产 4.7%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20216003

品种名称：隆两优 6018

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南亚华种业有限公司

品种来源：隆科 638S × 华恢 6018

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 138.0 天，比对照 Y 两优 1 号长 1.2 天。株高 124.8 厘米，亩有效穗 15.3 万穗，每穗总粒数 185.1 粒，结实率 88.4%，千粒重 26.3 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 4.0 级，穗瘟损失率 1.7 级，稻瘟病综合抗性指数 2.6，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 80.5%，精米率 69.2%，整精米率 61.1%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 10%，垩白度 1.4%，透明度 1 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 72 毫米，直链淀粉含量 15.2%，稻米蒸煮食用感官评价 83.4 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟组区域试验，平均亩产 630.7 千克，比对照增产 3.2%；2020 年续试，平均亩产 610.9 千克，比对照增产 1.0%；两年区域试验平均亩产 620.8 千克，比对照增产 2.1%。2020 年生产试验，平均亩产 616.0 千克，比对照增产 3.9%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20216004

品种名称：臻两优农占

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南亚华种业有限公司

品种来源：隆臻 36S × 农占

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 140.0 天，比对照 Y 两优 1 号长 3.5 天。株高 119.3 厘米，亩有效穗 15.8 万穗，每穗总粒数 187.5 粒，结实率 84.4%，千粒重 26.4 克。抗性：叶瘟 2.8 级，穗瘟 3.7 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 2.6，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 80.5%，精米率 72.1%，整精米率 69.6%，粒长 6.8 毫米，长宽比 3.1，垩白粒率 9%，垩白度 2.3%，透明度 1 级，碱消值 3.5 级，胶稠度 66 毫米，直链淀粉含量 15.1%。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟组区域试验，平均亩产 618.8 千克，比对照增产 2.8%；2020 年续试，平均亩产 613.0 千克，比对照增产 3.3%；两年区域试验平均亩产 615.9 千克，比对照增产 3.1%。2020 年生产试验，平均亩产 612.9 千克，比对照增产 3.4%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20216005

品种名称：臻两优钰占

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：隆臻 36S × 钰占

特征特性：籼型两系杂交中稻迟熟品种。在湖南省作迟熟中稻栽培，全生育期 138.8 天，比对照 Y 两优 1 号长 2.3 天。株高 129.9 厘米，亩有效穗 15.3 万穗，每穗总粒数 184.3 粒，结实率 85.4%，千粒重 26.5 克。抗性：叶瘟 2.6 级，穗瘟 3.7 级，穗瘟损失率 1.7 级，稻瘟病综合抗性指数 2.4，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 66.6%，整精米率 58.9%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.7，垩白粒率 9%，垩白度 2.5%，透明度 1 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 75 毫米，直链淀粉含量 16.0%，稻米蒸煮食用感官评价 79.4 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟组区域试验，平均亩产 620.4 千克，比对照增产 3.0%；2020 年续试，平均亩产 625.5 千克，比对照增产 5.4%；两年区域试验平均亩产 623.0 千克，比对照增产 4.2%。2020 年生产试验，平均亩产 605.1 千克，比对照增产 2.0%。

栽培技术要点：4 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟中稻种植。

审定编号：湘审稻 20216006

品种名称：炫两优 2646

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华炫 302S×华恢 2646

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 116.3 天，比对照 C 两优 343 短 4.4 天。株高 110.6 厘米，亩有效穗 17.9 万穗，每穗总粒数 187.5 粒，结实率 87.2%，千粒重 22.1 克。抗性：叶瘟 5.0 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 4.3 级，稻瘟病综合抗性指数 4.8，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 70.5%，整精米率 63.6%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.7，垩白粒率 9%，垩白度 1.3%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 67 毫米，直链淀粉含量 16.7%，稻米蒸煮食用感官评价 77.8 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 612.8 千克，比对照减产 1.6%；2020 年续试，平均亩产 622.1 千克，比对照减产 0.2%；两年区域试验平均亩产 617.5 千克，比对照减产 0.9%。2020 年生产试验，平均亩产 595.0 千克，比对照增产 1.9%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20216007

品种名称：悦两优 2945

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华悦 468S×华恢 2945

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 120.4 天，比对照 C 两优 343 短 0.3 天。株高 116.0 厘米，亩有效穗 17.0 万穗，每穗总粒数 207.9 粒，结实率 84.5%，千粒重 21.8 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 3.7 级，穗瘟损失率 2.3 级，稻瘟病综合抗性指数 2.9，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 4.0 级。米质主要指标：糙米率 79.1%，精米率 69.7%，整精米率 64.1%，粒长 6.5 毫米，长宽比 3.5，垩白粒率 11%，垩白度 2.3%，透明度 2 级，碱消值 6.0 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.0%，稻米蒸煮食用感官评价 78.8 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 620.8 千克，比对照减产 0.3%；2020 年续试，平均亩产 632.4 千克，比对照增产 1.5%；两年区域试验平均亩产 626.6 千克，比对照增产 0.6%。2020 年生产试验，平均亩产 600.0 千克，比对照增产 2.8%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、稻瘟病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20216008

品种名称：振两优钰占

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南亚华种业有限公司

品种来源：振湘 S×钰占

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 117.0 天，比对照 C 两优 343 短 3.6 天。株高 118.8 厘米，亩有效穗 17.3 万穗，每穗总粒数 178.7 粒，结实率 85.0%，千粒重 23.8 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 3.3 级，穗瘟损失率 1.7 级，稻瘟病综合抗性指数 2.4，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 66.6%，整精米率 55.0%，粒长 7.3 毫米，长宽比 4.1，垩白粒率 8%，垩白度 1.9%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 65 毫米，直链淀粉含量 15.9%。在 2020 年湖南省第十三次优质稻品种评选中，被评为二等优质稻品种。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 592.0 千克，比对照减产 4.9%；2020 年续试，平均亩产 602.2 千克，比对照减产 3.4%；两年区域试验平均亩产 597.1 千克，比对照减产 4.2%。2020 年生产试验，平均亩产 571.6 千克，比对照减产 2.1%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20216009

品种名称：悦两优 2056

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华悦 468S×R2056

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 119.5 天，比对照 C 两优 343 短 0.9 天。株高 119.5 厘米，亩有效穗 18.0 万穗，每穗总粒数 172.1 粒，结实率 84.2%，千粒重 22.9 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 4.7 级，穗瘟损失率 2.6 级，稻瘟病综合抗性指数 3.3，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.5 级。米质主要指标：糙米率 77.0%，精米率 69.3%，整精米率 60.1%，粒长 7.1 毫米，长宽比 4.0，垩白粒率 4%，垩白度 1.2%，透明度 2 级，碱消值 6.3 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.6%，稻米蒸煮食用感官评价 83.7 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 595.7 千克，比对照减产 4.4%；2020 年续试，平均亩产 613.6 千克，比对照减产 2.4%；两年区域试验平均亩产 604.7 千克，比对照减产 3.4%。2020 年生产试验，平均亩产 577.4 千克，比对照减产 2.2%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 8.0-10.0 千克，大田亩用种量 1.0 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20216010

品种名称：炫两优 8749

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华炫 302S×华恢 8749

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 117.3 天，比对照 C 两优 343 短 3.2 天。株高 116.3 厘米，亩有效穗 16.9 万穗，每穗总粒数 190.5 粒，结实率 87.3%，千粒重 25.3 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.3 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.6，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 79.3%，精米率 70.9%，整精米率 63.1%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 5%，垩白度 1.0%，透明度 2 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.8%，稻米蒸煮食用感官评价 80.0 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 624.0 千克，比对照增产 0.2%；2020 年续试，平均亩产 667.4 千克，比对照增产 6.2%；两年区域试验平均亩产 645.7 千克，比对照增产 3.2%。2020 年生产试验，平均亩产 597.4 千克，比对照增产 1.2%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20216011

品种名称：振两优 6246

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：振湘 S×华恢 6246

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 116.7 天，比对照 C 两优 343 短 3.9 天。株高 118.7 厘米，亩有效穗 17.4 万穗，每穗总粒数 179.6 粒，结实率 84.1%，千粒重 23.9 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 4.3 级，穗瘟损失率 2.4 级，稻瘟病综合抗性指数 3.1，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 71.6%，整精米率 64.2%，粒长 7.4 毫米，长宽比 4.0，垩白粒率 4%，垩白度 1.0%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 61 毫米，直链淀粉含量 17.3%，稻米蒸煮食用感官评价 82.6 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 575.1 千克，比对照减产 7.7%；2020 年续试，平均亩产 616.6 千克，比对照减产 1.9%；两年区域试验平均亩产 595.9 千克，比对照减产 4.8%。2020 年生产试验，平均亩产 566.6 千克，比对照减产 0.8%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20216012

品种名称：玮两优倩丝

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华玮 338S×倩丝

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 122.8 天，比对照 C 两优 343 长 2.6 天。株高 120.3 厘米，亩有效穗 16.1 万穗，每穗总粒数 198.4 粒，结实率 86.5%，千粒重 24.6 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 4.0 级，穗瘟损失率 2.6 级，稻瘟病综合抗性指数 3.1，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.8 级。米质主要指标：糙米率 78.6%，精米率 70.1%，整精米率 59.4%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 17%，垩白度 4.3%，透明度 2 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 62 毫米，直链淀粉含量 17.1%。在 2020 年湖南省第十三次优质稻品种评选中，被评为二等优质稻品种。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 614.7 千克，比对照增产 0.8%；2020 年续试，平均亩产 674.7 千克，比对照增产 7.3%；两年区域试验平均亩产 644.7 千克，比对照增产 4.1%。2020 年生产试验，平均亩产 607.4 千克，比对照增产 2.9%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20216013

品种名称：炫两优 8736

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华炫 302S×华恢 8736

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 116.7 天，比对照 C 两优 343 短 3.9 天。株高 109.9 厘米，亩有效穗 19.0 万穗，每穗总粒数 178.2 粒，结实率 84.6%，千粒重 22.1 克。抗性：叶瘟 5.2 级，穗瘟 6.7 级，穗瘟损失率 4.3 级，稻瘟病综合抗性指数 5.2，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 71.2%，整精米率 65.0%，粒长 6.3 毫米，长宽比 3.2，垩白粒率 15%，垩白度 2.4%，透明度 2 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.5%，稻米蒸煮食用感官评价 80.9 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 592.6 千克，比对照减产 1.9%；2020 年续试，平均亩产 624.6 千克，比对照减产 0.7%；两年区域试验平均亩产 608.6 千克，比对照减产 1.3%。2020 年生产试验，平均亩产 583.7 千克，比对照增产 1.3%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20216014

品种名称：臻两优泰丝

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：隆臻 36S × 泰丝

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 123.6 天，比对照 C 两优 343 长 3.1 天。株高 126.4 厘米，亩有效穗 16.4 万穗，每穗总粒数 195.4 粒，结实率 82.8%，千粒重 25.8 克。抗性：叶瘟 2.7 级，穗瘟 2.7 级，穗瘟损失率 1.4 级，稻瘟病综合抗性指数 2.0，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 5.0 级。米质主要指标：糙米率 78.3%，精米率 71.1%，整精米率 65.2%，粒长 7.0 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 13%，垩白度 2.5%，透明度 1 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 65 毫米，直链淀粉含量 16.5%，稻米蒸煮食用感官评价 76.9 分。米质综合定级为部颁标准三级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 616.0 千克，比对照增产 2.0%；2020 年续试，平均亩产 644.9 千克，比对照增产 2.5%；两年区域试验平均亩产 630.5 千克，比对照增产 2.3%。2020 年生产试验，平均亩产 566.4 千克，比对照增产 1.7%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米 × 26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万左右。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、稻瘟病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20216015

品种名称：振两优 3228

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：振湘 S×华恢 3228

特征特性：籼型两系杂交一季稻品种。在湖南省作一季稻栽培，全生育期 117.5 天，比对照 C 两优 343 短 3.0 天。株高 116.1 厘米，亩有效穗 18.8 万穗，每穗总粒数 171.4 粒，结实率 82.6%，千粒重 22.8 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 2.6 级，稻瘟病综合抗性指数 3.4，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 67.9%，整精米率 55.0%，粒长 7.5 毫米，长宽比 4.2，垩白粒率 11%，垩白度 2.0%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 62 毫米，直链淀粉含量 16.2%，稻米蒸煮食用感官评价 80.6 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司中稻迟熟二组区域试验，平均亩产 557.6 千克，比对照减产 7.7%；2020 年续试，平均亩产 607.6 千克，比对照减产 3.4%；两年区域试验平均亩产 582.6 千克，比对照减产 5.6%。2020 年生产试验，平均亩产 557.0 千克，比对照减产 3.3%。

栽培技术要点：5 月中下旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 0.75-1.0 千克，秧龄 30 天以内。种植密度 16.7 厘米×26.7 厘米，每穴插 2 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病、螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作一季稻种植。

审定编号：湘审稻 20216016

品种名称：晖两优 1308

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院、湖南百分农业科技有限公司

品种来源：华晖 217S × 华恢 1308

特征特性：籼型两系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 112.2 天，比对照岳优 9113 短 2.1 天。株高 106.0 厘米，亩有效穗 20.6 万穗，每穗总粒数 132.6 粒，结实率 85.3%，千粒重 25.3 克。抗性：叶瘟 3.3 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.6，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 79.9%，精米率 71.6%，整精米率 67.1%，粒长 6.7 毫米，长宽比 3.3，垩白粒率 16%，垩白度 2.1%，透明度 1 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 57 毫米，直链淀粉含量 16.9%。

产量表现：2018 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司晚稻中熟组区域试验，平均亩产 575.1 千克，比对照增产 2.5%；2019 年续试，平均亩产 561.9 千克，比对照增产 2.5%；两年区域试验平均亩产 568.5 千克，比对照增产 2.5%。2020 年生产试验，平均亩产 492.4 千克，比对照增产 3.7%。

栽培技术要点：6 月中下旬播种，秧田亩播种量 12.0 千克，大田亩用种量 1.25-1.5 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6.0 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20216017

品种名称：晖两优钰占

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：华晖 217S × 钰占

特征特性：籼型两系杂交晚稻中熟品种。在湖南省作中熟晚稻栽培，全生育期 113.4 天，比对照岳优 9113 短 2.5 天。株高 111.0 厘米，亩有效穗 20.4 万穗，每穗总粒数 150.9 粒，结实率 83.2%，千粒重 24.3 克。抗性：叶瘟 3.0 级，穗瘟 4.7 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.3，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 4.5 级。米质主要指标：糙米率 78.5%，精米率 70.7%，整精米率 67.3%，粒长 6.9 毫米，长宽比 3.6，垩白粒率 11%，垩白度 3.4%，透明度 1 级，碱消值 5.0 级，胶稠度 70 毫米，直链淀粉含量 15.8%。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司晚稻中熟组区域试验，平均亩产 567.3 千克，比对照增产 3.4%；2020 年续试，平均亩产 563.2 千克，比对照增产 4.1%；两年区域试验平均亩产 565.3 千克，比对照增产 3.8%。2020 年生产试验，平均亩产 499.0 千克，比对照增产 5.1%。

栽培技术要点：湘北 6 月 20-22 日播种，湘中南 6 月 23-25 日播种，秧田亩播种量 12.0 千克，大田亩用种量 1.25-1.5 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作中熟晚稻种植。

审定编号： 湘审稻 20216018

品种名称： 韵两优 526

申 请 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者： 袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源： 韵 2013S×K526

特征特性： 籼型两系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 119.8 天，比对照天优华占短 1.2 天。株高 109.8 厘米，亩有效穗 19.8 万穗，每穗总粒数 154.6 粒，结实率 85.9%，千粒重 23.3 克。抗性：叶瘟 3.5 级，穗瘟 4.7 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.6，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 71.2%，整精米率 61.7%，粒长 6.6 毫米，长宽比 3.4，垩白粒率 6%，垩白度 1.0%，透明度 2 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.3%，稻米蒸煮食用感官评价 81.1 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现： 2018 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 614.1 千克，比对照增产 9.7%；2019 年续试，平均亩产 593.4 千克，比对照增产 0.7%；两年区域试验平均亩产 603.8 千克，比对照增产 5.2%。2019 年生产试验，平均亩产 588.2 千克，比对照减产 2.0%。

栽培技术要点： 6 月中旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×26.7 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见： 该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20216019

品种名称：隆锋优 3228

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：隆锋 18A × 华恢 3228

特征特性：籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 121.7 天，比对照天优华占短 0.9 天。株高 112.3 厘米，亩有效穗 19.9 万穗，每穗总粒数 166.4 粒，结实率 74.2%，千粒重 23.3 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 5.7 级，穗瘟损失率 2.7 级，稻瘟病综合抗性指数 3.6，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 69.5%，整精米率 64.5%，粒长 7.3 毫米，长宽比 4.0，垩白粒率 3%，垩白度 0.6%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 72 毫米，直链淀粉含量 16.7%，稻米蒸煮食用感官评价 81.0 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 567.7 千克，比对照减产 4.9%；2020 年续试，平均亩产 495.6 千克，比对照减产 5.7%；两年区域试验平均亩产 531.7 千克，比对照减产 5.3%。2020 年生产试验，平均亩产 459.3 千克，比对照减产 2.2%。

栽培技术要点：湘北 6 月 13-15 日播种，湘中南 6 月 15-20 日播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20216020

品种名称：隆晶优 1266

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：隆晶 4302A × 华恢 1266

特征特性：籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 123.6 天，比对照天优华占长 1.1 天。株高 111.0 厘米，亩有效穗 19.4 万穗，每穗总粒数 164.7 粒，结实率 78.0%，千粒重 25.3 克。抗性：叶瘟 3.2 级，穗瘟 4.0 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 2.8，白叶枯病 6.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 70.0%，整精米率 62.3%，粒长 7.5 毫米，长宽比 3.9，垩白粒率 5%，垩白度 1.0%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.2%，稻米蒸煮食用感官评价 83.7 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 583.2 千克，比对照减产 2.3%；2020 年续试，平均亩产 506.1 千克，比对照减产 3.8%；两年区域试验平均亩产 544.7 千克，比对照减产 3.1%。2020 年生产试验，平均亩产 462.1 千克，比对照减产 1.6%。

栽培技术要点：湘北 6 月 13-15 日播种，湘中南 6 月 15-20 日播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20216021

品种名称：增两优 5629

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南民升种业科学研究院有限公司

品种来源：增 S×R5629

特征特性：籼型两系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 121.1 天，比对照天优华占短 0.6 天。株高 112.4 厘米，亩有效穗 21.6 万穗，每穗总粒数 158.7 粒，结实率 76.6%，千粒重 23.8 克。抗性：叶瘟 3.3 级，穗瘟 5.0 级，穗瘟损失率 3.0 级，稻瘟病综合抗性指数 3.6，白叶枯病 5.0 级，稻曲病 3.5 级。米质主要指标：糙米率 81.0%，精米率 71.1%，整精米率 61.5%，粒长 7.6 毫米，长宽比 4.1，垩白粒率 4%，垩白度 0.5%，透明度 1 级，碱消值 6.5 级，胶稠度 60 毫米，直链淀粉含量 16.6%，稻米蒸煮食用感官评价 82.0 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 556.6 千克，比对照减产 5.2%；2020 年续试，平均亩产 537.8 千克，比对照增产 2.0%；两年区域试验平均亩产 547.2 千克，比对照减产 1.6%。2020 年生产试验，平均亩产 470.4 千克，比对照减产 0.9%。

栽培技术要点：6 月中旬播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 25 天以内。种植密度 20.0 厘米×20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 7 万左右。需肥水平中等，重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治稻瘟病、白叶枯病、纹枯病、稻曲病、南方黑条矮缩病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审稻 20216022

品种名称：隆锋优 8262

申 请 者：袁隆平农业高科技股份有限公司

育 种 者：袁隆平农业高科技股份有限公司、湖南隆平高科种业科学研究院有限公司、湖南亚华种业科学研究院

品种来源：隆锋 18A × 华恢 8262

特征特性：籼型三系杂交晚稻迟熟品种。在湖南省作迟熟晚稻栽培，全生育期 122.8 天，比对照天优华占长 0.1 天。株高 114.9 厘米，亩有效穗 19.4 万穗，每穗总粒数 154.4 粒，结实率 79.2%，千粒重 24.6 克。抗性：叶瘟 2.9 级，穗瘟 4.3 级，穗瘟损失率 2.0 级，稻瘟病综合抗性指数 2.8，白叶枯病 7.0 级，稻曲病 3.0 级。米质主要指标：糙米率 79.0%，精米率 70.6%，整精米率 67.4%，粒长 7.2 毫米，长宽比 3.8，垩白粒率 6%，垩白度 1.7%，透明度 1 级，碱消值 7.0 级，胶稠度 64 毫米，直链淀粉含量 16.7%，稻米蒸煮食用感官评价 8.32 分。米质综合定级为部颁标准二级优质稻。

产量表现：2019 年参加袁隆平农业高科技股份有限公司晚稻迟熟组区域试验，平均亩产 583.8 千克，比对照减产 1.0%；2020 年续试，平均亩产 512.8 千克，比对照减产 2.8%；两年区域试验平均亩产 548.3 千克，比对照减产 1.9%。2020 年生产试验，平均亩产 467.3 千克，比对照减产 1.5%。

栽培技术要点：湘北 6 月 13-15 日播种，湘中南 6 月 15-20 日播种，秧田亩播种量 10.0 千克，大田亩用种量 1.0-1.25 千克，秧龄 28 天以内。种植密度 20.0 厘米 × 20.0 厘米，每穴插 2-3 粒谷秧，亩基本苗 6 万以上。重施底肥，早施追肥，后期看苗补施穗肥。深水活蔸，浅水分蘖，及时晒田，有水壮苞抽穗，后期干干湿湿，不脱水过早。注意防治螟虫、稻纵卷叶螟、稻飞虱、稻瘟病、白叶枯病、南方黑条矮缩病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

审定意见：该品种经袁隆平农业高科技股份有限公司自行试验，符合湖南省稻品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省稻瘟病轻发区作迟熟晚稻种植。

审定编号：湘审玉 20210001

品种名称：福玉 18

申 请 者：湖南继福种业科技有限公司

育 种 者：湖南继福种业科技有限公司

品种来源：西 V21×毛白 11

特征特性：在湖南省做春玉米种植，生育期 116.5 天，幼苗叶鞘绿色，株型半紧凑型，株高 239.8 厘米，穗位高 100.3 厘米，成株叶片数 18-20 片，果穗长筒型，穗长 18 厘米，秃尖长 0.6 厘米，穗粗 5.2 厘米，穗行数 15.4 行，行粒数 37.3 粒，穗轴白色，籽粒马齿型，黄白色，百粒重 34.7 克。田间表现空秆率 3.2%，无倒伏、倒折。抗病性鉴定结果：感纹枯病，抗小斑病，中抗茎腐病。品质：籽粒容重 731.5 克/升，粗蛋白质含量 9.61%，粗脂肪含量 4.60%，粗淀粉含量 70.21%，赖氨酸含量 0.32%。

产量表现：2019 年参加湖南省区域试验，平均亩产 509.3 千克，比对照增产 4.3%；2020 年续试，平均亩产 474.3 千克，比对照增产 5.5%；两年区域试验平均亩产 491.8 千克，比对照增产 4.9%。2020 年生产试验，平均亩产 517.9 千克，比对照增产 6.9%。

栽培技术要点：湘南 3 月中、下旬，湘中 3 月下旬，湘西北 3 月底至 4 月初播种，每亩种植 3200-3500 株。施足基肥，亩施农家肥 1000-2000 千克，三元复合肥 50 千克，在四叶期至拔节期亩施尿素 10-15 千克。及时防治纹枯病和玉米螟，全生育期防控草地贪夜蛾。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春玉米种植。

审定编号：湘审玉 20210002

品种名称：K 玉 28

申 请 者：重庆市农业科学院、重庆科光种苗有限公司

育 种 者：重庆市农业科学院、重庆科光种苗有限公司

品种来源：渝 501×渝 988

特征特性：在湖南省做春玉米种植，生育期 112.6 天，幼苗叶鞘紫色，株型半紧凑型，株高 265.7 厘米，穗位高 110.0 厘米，成株叶片数 18-19 片，果穗长筒型，穗长 19.3 厘米，秃尖长 0.9 厘米，穗粗 5.1 厘米，穗行数 16.7 行，行粒数 40.0 粒，穗轴白色，籽粒马齿型,黄色，百粒重 31.9 克。田间表现空秆率 0.4%，无倒伏、倒折。抗病性鉴定结果：中抗纹枯病，抗小斑病，中抗茎腐病。品质：籽粒容重 762 克/升，粗蛋白质含量 10.67%，粗脂肪含量 3.72%，粗淀粉含量 74.60%，赖氨酸含量 0.31%。

产量表现：2018 年参加湖南省区域试验，平均亩产 553.5 千克，比对照增产 5.8%；2019 年续试，平均亩产 525.8 千克，比对照增产 7.7%；两年区域试验平均亩产 539.7 千克，比对照增产 6.8%。2020 年生产试验，平均亩产 526.8 千克，比对照增产 6.0%。

栽培技术要点：湘南 3 月中、下旬，湘中 3 月下旬，湘西北 3 月底至 4 月初播种，每亩种植 2800-3200 株。施足基肥，亩施农家肥 600 千克,三元复合肥 30-40 千克,在四叶期至拔节期亩施尿素 10-15 千克。及时防治纹枯病和玉米螟，全生育期防控草地贪夜蛾。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春玉米种植。

审定编号： 湘审玉 20210003

品种名称： 吉玉 518

申 请 者： 湖南湘西国家农业科技园区管理委员会、湖北康农种业股份有限公司

育 种 者： 湖南湘西国家农业科技园区管理委员会、湖北康农种业股份有限公司

品种来源： FL041 × FL310

特征特性： 在湖南省做春玉米种植，生育期 112.1 天，比对照短 0.2 天。幼苗叶鞘浅紫色，株型半紧凑型，株高 268.4 厘米，穗位高 111.3 厘米，成株叶片数 18-20 片，果穗长筒型，穗长 19.9 厘米，秃尖长 0.5 厘米，穗粗 5.4 厘米，穗行数 17.6 行，行粒数 38.6 粒，穗轴白色，籽粒马齿型，黄色，百粒重 31.2 克。田间表现空秆率 0.2%，无倒伏、倒折。抗病性鉴定结果：抗纹枯病，中抗小斑病，中抗茎腐病。品质：籽粒容重 740 克/升，粗蛋白质含量 10.16%，粗脂肪含量 3.44%，粗淀粉含量 70.07%，赖氨酸含量 0.34%。

产量表现： 2017 年参加湖南省区域试验，平均亩产 488.5 千克，比对照增产 6.9%；2018 年续试，平均亩产 549.4 千克，比对照增产 5.1%；两年区域试验平均亩产 519.0 千克，比对照增产 6.0%。2018 年生产试验，平均亩产 554.4 千克，比对照增产 8.6%。

栽培技术要点： 湘南 3 月中、下旬，湘中 3 月下旬，湘西北 3 月底至 4 月初播种，每亩种植 2800-3200 株。施足基肥，亩施农家肥 1000-2000 千克，三元复合肥 50 千克，在四叶期至拔节期亩施尿素 20 千克。及时防治纹枯病和玉米螟，全生育期防控草地贪夜蛾。

审定意见： 该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春玉米种植。

审定编号：湘审玉 20210004

品种名称：云黑糯 50 号

申 请 者：曲靖市农业科学院

育 种 者：曲靖市农业科学院

品种来源：JB001 × JH004

特征特性：糯玉米品种。在湖南省做春玉米种植，出苗至采收 87.3 天，比对照中糯 304 短 1.7 天。株高 223.7 厘米，穗位高 85.8 厘米，穗长 17.8 厘米，穗粗 4.8 厘米，秃尖长 1.0 厘米，穗行数 14.7 行，行粒数 35.7 粒，鲜百粒重 37.5 克，鲜出籽率 72.3%，双穗率 2.6%，空秆率 1.1%，倒伏率 0.4%，倒折率 0.3%。抗病性鉴定结果：抗纹枯病，抗小斑病，中抗茎腐病。品质检测：直链淀粉（干基）占粗淀粉总量比率 3.0%。鲜果穗品质评分 86.5 分。

产量表现：2019 年参加湖南省区域试验，鲜果穗亩产 772.1 千克，比对照增产 3.2%；2020 年续试，鲜果穗亩产 780.5 千克，比对照增产 3.3%；两年区域试验鲜果穗平均亩产 776.3 千克，比对照增产 3.3%。2020 年生产试验，平均亩产 757.2 千克，比对照增产 2.9%。

栽培技术要点：直播，露地栽培，春播可采用地膜覆盖栽培。春季露地栽培，土壤温度稳定在 12℃以上播种，播种深度 3-5 厘米，足墒下种。每亩种植 3200-3300 株，授粉后 20-23 天收获为佳。肥水管理以促为主，苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，全生育期防控草地贪夜蛾。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春糯玉米种植。

审定编号：湘审玉 20210005

品种名称：精彩 919

申 请 者：南京秋田种业有限公司

育 种 者：南京秋田种业有限公司

品种来源：S23×B30

特征特性：糯玉米品种。在湖南省做春玉米种植，出苗至采收 89.2 天，与对照中糯 304 相当。株高 227.8 厘米，穗位高 90.6 厘米，穗长 19.2 厘米，穗粗 5.0 厘米，秃尖长 1.1 厘米，穗行数 14.9 行，行粒数 38.0 粒，鲜百粒重 40.6 克，鲜出籽率 73.1%，双穗率 2.9%，空秆率 0.3%，倒伏率 0.3%，倒折率 0.2%。抗病性鉴定结果：高抗纹枯病，感小斑病，高抗茎腐病。品质检测：直链淀粉（干基）占粗淀粉总量比率 4.9%。鲜果穗品质评分 88.2 分。

产量表现：2019 年参加湖南省区域试验，鲜果穗亩产 765.1 千克，比对照增产 2.3%；2020 年续试，鲜果穗亩产 810.0 千克，比对照增产 7.2%；两年区域试验鲜果穗平均亩产 787.6 千克，比对照增产 4.8%。2020 年生产试验，平均亩产 801.1 千克，比对照增产 8.9%。

栽培技术要点：直播，露地栽培，春播可采用地膜覆盖栽培。春季栽培，土壤温度稳定在 12℃以上播种，播种深度 3-5 厘米，足墒下种。每亩种植 2800-3000 株，授粉后 23-25 天收获为佳。肥水管理以促为主，苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，全生育期防控草地贪夜蛾。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春糯玉米种植。

审定编号：湘审玉 20210006

品种名称：晶甜 717

申 请 者：南京秋田种业有限公司

育 种 者：南京秋田种业有限公司

品种来源：JS1606×QT0805

特征特性：甜玉米品种。在湖南省做春玉米种植，出苗至采收 89.7 天，比对照粤甜 16 长 1.2 天。株高 232.6 厘米，穗位高 83.2 厘米，穗长 21.1 厘米，穗粗 5.2 厘米，秃尖长 1.3 厘米，穗行数 15.7 行，行粒数 39.6 粒，鲜百粒重 41.3 克，鲜出籽率 73.5%，籽粒深度 1.3 厘米，双穗率 3.3%，空秆率 0.6%，倒伏率 0.3%，倒折率 1.0%。抗病性鉴定结果：感纹枯病，中抗小斑病，抗茎腐病。品质检测：可溶性总糖含量 20.8%。鲜果穗品质评分 87.0 分。

产量表现：2019 年参加湖南省区域试验，鲜果穗亩产 804.5 千克，比对照增产 3.5%；2020 年续试，鲜果穗亩产 863.3 千克，比对照增产 7.4%；两年区域试验鲜果穗平均亩产 833.9 千克，比对照增产 5.5%。2020 年生产试验，平均亩产 844.8 千克，比对照增产 7.7%。

栽培技术要点：直播，露地栽培，春播可采用地膜覆盖栽培。春季栽培，土壤温度稳定在 12℃以上播种，播种深度 3-5 厘米，足墒下种。每亩种植 3000-3200 株，授粉后 21-23 天收获为佳。肥水管理以促为主，苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，全生育期防控草地贪夜蛾。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春甜玉米种植。

审定编号：湘审玉 20210007

品种名称：广良甜 27 号

申 请 者：广东省良种引进服务公司

育 种 者：广东省良种引进服务公司

品种来源：W03-2×W04-7

特征特性：甜玉米品种。在湖南省做春玉米种植，出苗至采收 90.5 天，比对照粤甜 16 长 2.0 天。株高 248.2 厘米，穗位高 91.6 厘米，穗长 20.5 厘米，穗粗 5.3 厘米，秃尖长 0.8 厘米，穗行数 15.7 行，行粒数 38.6 粒，鲜百粒重 43.3 克，鲜出籽率 74.9%，籽粒深度 1.3 厘米，双穗率 2.3%，空秆率 0.3%，倒伏率 0.3%，倒折率 0.2%。抗病性鉴定结果：中抗纹枯病，中抗小斑病，高抗茎腐病。品质检测：可溶性总糖含量 13.3%。鲜果穗品质评分 87.7 分。

产量表现：2019 参加湖南省区域试验，鲜果穗平均亩产 850.0 千克，比对照增产 9.3%；2020 续试，鲜果穗平均亩产 844.8 千克，比对照增产 7.7%；两年区域试验鲜果穗平均亩产 847.4 千克，比对照增产 8.5%。2020 年生产试验，平均亩产 850.7 千克，比对照增产 8.5%。

栽培技术要点：直播，露地栽培，春播可采用地膜覆盖栽培。春季栽培，土壤温度稳定在 12℃以上播种，播种深度 3-5 厘米，足墒下种。每亩种植 3000-3200 株，授粉后 21-23 天收获为佳。肥水管理以促为主，苗期防治地老虎，大喇叭口期防治玉米螟，全生育期防控草地贪夜蛾。

审定意见：该品种符合湖南省玉米品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春甜玉米种植。

审定编号： 湘审豆 20210001

品种名称： 衡春豆 9 号

申 请 者： 衡阳市农业科学院

育 种 者： 衡阳市农业科学院

品种来源： 95-113/山黄豆

特征特性：高蛋白型中熟春大豆品种。湖南春播全生育期 103 天。株高 48.9 厘米，有效分枝 2.8 个，主茎节 11.0 个。株型收敛，有限结荚习性，白花，灰毛，单株有效荚数 29.0 个，单株粒数 60.7 粒，单株粒重 12.3 克，荚熟时浅褐色，底荚高度 11.6 厘米。籽粒椭圆形，种皮黄色，子叶黄色，种脐黑色，百粒重 20.8 克。对大豆花叶病毒病、霜霉病、细菌性斑点病具有较好的田间抗性，人工接种大豆花叶病毒流行株系 SC3 和 SC7 进行抗性鉴定，表现中抗和抗病。品质：粗蛋白质含量 45.77%，粗脂肪含量 18.83%。

产量表现： 2019 年参加湖南省区域试验，平均亩产 190.6 千克，比对照湘春豆 24 增产 5.9%；2020 年续试，平均亩产 185.9 千克，比对照增产 7.3%；两年区域试验平均亩产 188.3 千克，比对照增产 6.6%。2020 年生产试验，平均亩产 179.9 千克，比对照增产 9.0%。

栽培技术要点： 3 月下旬至 4 月上旬播种，行距 40 厘米，条播株距 10 厘米，穴播每穴留苗 2 株，穴距 20 厘米，亩种植 1.67 万株，低肥力地块 2.5 万株，每穴留苗 3 株。亩施 1500-2000 千克土杂肥或氮磷钾三元复合肥 15-20 千克，过磷酸钙 40-50 千克作基肥，苗期视苗情适当追肥，一般每亩追施复合肥 5-10 千克，鼓荚期叶面喷施磷酸二氢钾作壮籽肥。及时防虫治病，豆苗封行前中耕除草。遇涝排渍，遇旱灌水。

审定意见： 该品种符合湖南省大豆品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春大豆种植。

审定编号： 湘审豆 20210002

品种名称： 中豆 45

申 请 者： 中国农业科学院油料作物研究所

育 种 者： 中国农业科学院油料作物研究所

品种来源： Gaj/新六青

特征特性：普通型中熟春大豆品种。湖南春播全生育期 105.0 天。株高 57.9 厘米，有效分枝 2.6 个，主茎节 11.5 个。株型收敛，有限结荚习性，白花，灰毛，单株有效荚数 30.2 个，单株粒数 56.6 粒，单株粒重 12.1 克，荚熟时褐色，底荚高度 12.5 厘米。籽粒椭圆形，种皮黄色，子叶黄色，种脐褐色，百粒重 22.1 克。对大豆花叶病毒病、霜霉病、细菌性斑点病具有较好的田间抗性。人工接种大豆花叶病毒流行株系 SC3 和 SC7 进行抗性鉴定，表现抗病。品质：粗蛋白质含量 42.82%，粗脂肪含量 19.90%。

产量表现： 2019 年参加湖南省区域试验，平均亩产 189.1 千克，比对照湘春豆 24 增产 5.1%；2020 年续试，平均亩产 177.6 千克，比对照增产 2.5%；两年区域试验平均亩产 183.4 千克，比对照增产 3.8%。2020 年生产试验，平均亩产 178.9 千克，比对照增产 8.4%。

栽培技术要点： 3 月下旬至 4 月上旬播种，行距 40 厘米，条播株距 10 厘米，穴播每穴留苗 2 株，穴距 20 厘米，亩种植 1.3-1.7 万株。亩施氮磷钾三元复合肥 30 千克作基肥，初花期亩追施尿素 10 千克。及时防虫治病，豆苗封行前中耕除草。遇涝排渍，遇旱灌水。

审定意见： 该品种符合湖南省大豆品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春大豆种植。

审定编号： 湘审豆 20210003

品种名称： 湘春褐豆 32

申 请 者： 湖南省作物研究所

育 种 者： 湖南省作物研究所

品种来源： 黑 363/鄂豆 4 号

特征特性： 蛋白质和脂肪双高型中熟春大豆品种。湖南春播全生育期 103.0 天。株高 45.7 厘米，有效分枝 2.4 个，主茎节 11.6 个。株型收敛，有限结荚习性，白花，灰毛，单株有效荚数 30.7 个，单株粒数 61.4 粒，单株粒重 11.7 克，荚熟时黄色，底荚高度 9.9 厘米。籽粒椭圆形，种皮褐色，子叶黄色，种脐褐色，百粒重 19.6 克。对大豆花叶病毒病、霜霉病、细菌性斑点病具有较好的田间抗性。人工接种大豆花叶病毒流行株系 SC3 和 SC7 进行抗性鉴定，表现抗病和中抗。品质：粗蛋白质含量 41.71%，粗脂肪含量 21.71%。

产量表现： 2019 年参加湖南省区域试验，平均亩产 190.8 千克，比对照湘春豆 24 增产 6.1%；2020 年续试，平均亩产 187.3 千克，比对照增产 8.1%；两年区域试验平均亩产 189.1 千克，比对照增产 7.1%。2020 年生产试验，平均亩产 187.3 千克，比对照增产 13.5%。

栽培技术要点： 3 月下旬至 4 月上旬播种，行距 40 厘米，条播株距 10 厘米，穴播每穴留苗 2 株，穴距 20 厘米，亩种植 1.67 万株。亩施 50 千克钙镁磷肥作基肥，分枝期根据苗情亩追施氮磷钾三元复合肥 10-15 千克。及时防虫治病，豆苗封行前中耕除草。遇涝排渍，遇旱灌水。

审定意见： 该品种符合湖南省大豆品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作春大豆种植。

审定编号： 湘审豆 20210004

品种名称： 湘鲜春豆 1 号

申 请 者： 湖南省作物研究所

育 种 者： 湖南省作物研究所

品种来源： AG381/黑五叶

特征特性： 鲜食春大豆品种。湖南春播全生长期 93.0 天。株高 52.9 厘米，主茎节数 10.0 个，分枝数 2.3 个。株型收敛，有限结荚习性，白花，灰毛，单株荚数 24.5 个，单株鲜荚重 56.5 克，500 克标准荚数 194 个，标准二粒荚长 5.4 厘米、荚宽 1.3 厘米，百粒鲜重 62.6 克。干籽粒圆形，种皮绿色，子叶黄色，种脐黄色。对大豆花叶病毒病、霜霉病、细菌性斑点病具有较好的田间抗性。人工接种大豆花叶病毒流行株系 SC3 和 SC7 进行抗性鉴定，表现中抗和抗病。品质：综合评价口感为香甜柔糯型。

产量表现： 2019 年参加湖南省区域试验，平均亩产 792.8 千克，比对照绿宝石增产 5.8%；2020 年续试，平均亩产 750.9 千克，比对照增产 10.0%；两年区域试验平均亩产 771.9 千克，比对照增产 7.9%。2020 年生产试验，平均亩产 722.3 千克，比对照增产 10.2%。

栽培技术要点： 3 月下旬至 4 月上旬播种，行距 40 厘米，条播株距 10 厘米，穴播每穴留苗 2 株，穴距 20 厘米，亩种植 1.67 万株。亩施 50 千克钙镁磷肥作基肥，分枝期根据苗情亩追施氮磷钾三元复合肥 10-15 千克。及时防虫治病，豆苗封行前中耕除草。遇涝排渍，遇旱灌水。

审定意见： 该品种符合湖南省大豆品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省作鲜食春大豆种植。

审定编号：湘审棉 20210001

品种名称：湘 X0935

申 请 者：湖南省棉花科学研究所

育 种 者：湖南省棉花科学研究所

品种来源：湘 176/湘 267

特征特性：转抗虫基因中熟常规棉品种。湖南春播生育期 123.5 天，比对照湘杂棉 7 号长 1.6 天。株高 125.4 厘米，茎秆茸毛较多，叶片中等大小，叶色深绿，花药白色。铃呈卵圆形，单株成铃 43.6 个，单铃籽棉重 6.2 克，衣分 41.2%，籽指 11.8 克，衣指 7.8 克，霜前花率 98.0%。抗性：枯萎病病指 12.6，耐枯萎病；黄萎病病指 23.2，耐黄萎病。品质：HVICC 纤维上半部平均长度 32.0 毫米，断裂比强度 37.1 厘牛/特克斯，马克隆值 4.5，整齐度指数 86.2%，纺纱均匀性指数 179.4。

产量表现：2019 年参加湖南省区域试验，平均亩产皮棉 117.6 千克，比对照增产 0.7%；2020 年续试，平均亩产皮棉 110.0 千克，比对照增产 4.4%；两年区域试验平均亩产皮棉 113.8 千克，比对照增产 2.6%。2020 年生产试验，平均亩产皮棉 111.4 千克，比对照增产 6.2%。

栽培技术要点：4 月中旬营养钵育苗移栽，每亩种植 1400-1800 株；5 月上中旬直播，每亩种植 2500-3000 株，行距 90-100 厘米。施足底肥，多施有机肥，增施磷、钾肥和硼、锌等微肥，花铃期依长势适量追肥。化学调控，遵循少量多次、前轻后重原则。适时中耕，起垄培土。遇高温干旱及时灌水抗旱。苗蕾期及时防治棉蚜虫、棉红蜘蛛，对蕾铃期害虫应根据虫情预报及时防治。

审定意见：该品种符合湖南省棉花品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省棉区种植。枯、黄萎病重发区不宜种植。

审定编号：湘审棉 20210002

品种名称：中棉所 1606

申 请 者：中国农业科学院棉花研究所

育 种 者：中国农业科学院棉花研究所

品种来源：901A/CRIZ140103

特征特性：转抗虫基因早熟常规棉品种。湖南夏播生育期 99.3 天，比对照省工棉 2 号短 3.3 天。株高 97.3 厘米，茎秆纤毛较多，花药白色，叶片中等大小，叶色浅绿，花药白色。铃呈卵圆形。单株成铃 21.6 个，单铃籽棉重 5.2 克，衣分 41.08%，子指 10.03 克，衣指 6.7 克，霜前花率 100％。抗性：枯萎病病指 15.8，耐枯萎病；黄萎病病指 18.4，抗黄萎病。品质：HVICC 纤维上半部平均长度 28.05 毫米，断裂比强度 32.67 厘牛/特克斯，马克隆值 5.13，整齐度指数 84.88%，纺纱均匀性指数 146.1。

产量表现：2019 年参加湖南省机采棉组区域试验，平均亩产皮棉 111.0 千克，比对照增产 5.6%；2020 年续试，平均亩产皮棉 96.2 千克，比对照增产 11.6%；两年区域试验平均亩产皮棉 103.6 千克，比对照增产 8.6%。2020 年生产试验，平均亩产皮棉 97.4 千克，比对照增产 8.4%。

栽培技术要点：5 月中下旬直播，每亩种植 4500-5500 株，行距 60-80 厘米。施足底肥，多施有机肥，增施磷、钾肥和硼、锌等微肥，重施花铃肥，根据苗情注意少量多次。化学调控，遵循少量多次、前轻后重原则。适时中耕，起垄培土。遇高温干旱及时灌水抗旱。苗蕾期及时防治棉蚜虫、棉红蜘蛛，对蕾铃期害虫应根据虫情预报及时防治。

审定意见：该品种符合湖南省机采棉品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省棉区种植。枯、黄萎病重发区不宜种植。

审定编号： 湘审棉 20210003

品种名称： 中 MB901

申 请 者： 中国农业科学院棉花研究所

育 种 者： 中国农业科学院棉花研究所

品种来源： 中 MB9029/MBI9915//中 MB9029/CRI70-92

特征特性： 转抗虫基因早熟常规棉品种。湖南夏播生育期 103.9 天，比对照省工棉 2 号长 1.3 天。株高 103.4 厘米，茎秆纤毛较多，叶片中等，叶色中绿，花药白色。铃呈卵圆形，单株成铃 21.5 个，单铃籽棉重 5.4 克，衣分 39.44%，子指 11.91 克，衣指 7.3 克，霜前花率 100％。抗性:枯萎病病指 15.7,耐枯萎病;黄萎病病指 24.25，耐黄萎病。品质：HVICC 纤维上半部平均长度 30.72 毫米，断裂比强度 34.1 厘牛/特克斯，马克隆值 4.85，整齐度指数 85.34%，纺纱均匀性指数 160.5。

产量表现： 2019 年参加湖南省机采棉组区域试验，平均亩产皮棉 105.7 千克，比对照增产 0.5%；2020 年续试，平均亩产皮棉 94.5 千克，比对照增产 9.6%；两年区域试验平均亩产皮棉 100.1 千克，比对照增产 5.1%。2020 年生产试验，平均亩产皮棉 93.3 千克，比对照增产 3.9%。

栽培技术要点： 5 月下旬至 6 月上旬直播，每亩种植 3000-4500 株，行距 76 厘米。施足底肥，多施有机肥，增施磷、钾肥和硼、锌等微肥，重施花铃肥，根据苗情注意少量多次。化学调控，遵循少量多次、前轻后重原则。适时中耕，起垄培土。遇高温干旱及时灌水抗旱。苗蕾期及时防治棉蚜虫、棉红蜘蛛，对蕾铃期害虫应根据虫情预报及时防治。

审定意见： 该品种符合湖南省机采棉品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省棉区种植。枯、黄萎病重发区不宜种植。

审定编号： 湘审棉 20210004

品种名称： 湘棉 36

申 请 者： 湖南省棉花科学研究所

育 种 者： 湖南省棉花科学研究所

品种来源： A071/湘 C086

特征特性： 转抗虫基因早熟常规棉品种。湖南夏播生育期 101.9 天，比对照省工棉 2 号短 0.7 天。株高 92.6 厘米，茎秆茸毛较多，叶片中等大小，叶色浅绿，花药白色。铃呈卵圆形，单株成铃 21.2 个，单铃籽棉重 5.2 克，衣分 40.37%，籽指 10.23 克，衣指 6.7 克，霜前花率 100%。抗性：枯萎病病指 10.2，耐枯萎病；黄萎病病指 14.8，抗黄萎病。品质：HVICC 纤维上半部平均长度 29.32 毫米，断裂比强度 31.06 厘牛/特克斯，马克隆值 4.78，纺纱均匀性指数 143.1。

产量表现： 2019 年参加湖南省机采棉组区域试验，平均亩产皮棉 100.1 千克，比对照减产 4.8%；2020 年续试，平均亩产皮棉 91.2 千克，比对照增产 5.8%；两年区域试验平均亩产皮棉 95.7 千克，比对照增产 0.5%。2020 年生产试验，平均亩产皮棉 93.4 千克，比对照增产 4.0%。

栽培技术要点： 5 月中下旬直播，每亩种植 5000-6000 株，行距 70-80 厘米。施足底肥，多施有机肥，增施磷、钾肥和硼、锌等微肥，花铃期依长势适量追肥。化学调控，遵循少量多次、前轻后重原则。适时中耕，起垄培土。遇高温干旱及时灌水抗旱。苗蕾期及时防治棉蚜虫、棉红蜘蛛，对蕾铃期害虫应根据虫情预报及时防治。

审定意见： 该品种符合湖南省棉花品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省棉区种植。枯、黄萎病重发区不宜种植。

审定编号： 湘审棉 20210005

品种名称： 盐棉 462

申 请 者： 江苏沿海地区农业科学研究所、安徽省农业科学院棉花研究所

育 种 者： 江苏沿海地区农业科学研究所、安徽省农业科学院棉花研究所、

品种来源： 盐棉 126/GK19

特征特性： 转抗虫基因早熟常规棉品种。湖南夏播生育期 99.6 天，比对照省工棉 2 号短 3.0 天。茎秆纤毛较多，叶片中等大小，叶色绿，花药白色。铃呈卵圆形，单株成铃 21.1 个，单铃籽棉重 5.0 克，衣分 40.83%，子指 10.7 克，衣指 7.2 克，霜前花率 100%。抗性：枯萎病病指 9.8，抗枯萎病；黄萎病病指 19.3，抗黄萎病。品质：HVICC 纤维上半部平均长度 27.87 毫米，断裂比强度 31.77 厘牛/特克斯，马克隆值 4.96，纺纱均匀性指数 143.1。

产量表现： 2019 年参加湖南省机采棉组区域试验，平均亩产皮棉 108.3 千克，比对照增产 3.0%；2020 年续试，平均亩产皮棉 92.4 千克，比对照增产 7.1%；两年区域试验平均亩产皮棉 100.4 千克，比对照增产 5.1%。2020 年生产试验，平均亩产皮棉 89.1 千克，比对照减产 0.8%。

栽培技术要点： 5 月中下旬直播，每亩种植 5000-6000 株，行距 70-80 厘米。施足底肥，多施有机肥，增施磷、钾肥和硼、锌等微肥，花铃期依长势适量追肥。化学调控，遵循少量多次、前轻后重原则。适时中耕，起垄培土。遇高温干旱及时灌水抗旱。苗蕾期及时防治棉蚜虫、棉红蜘蛛，根据虫情预报及时防治蕾铃期害虫。

审定意见： 该品种符合湖南省机采棉品种审定标准，通过审定。适宜在湖南省棉区种植。枯、黄萎病重发区不宜种植。